

AUGMENTATION DE LA PRESSION PULSEE (PP) ET DU DOUBLE PRODUIT « PP X FREQUENCE CARDIAQUE » CHEZ LE PATIENT DIABETIQUE DE TYPE 1 EN FONCTION DE L'AGE

Objectifs :

Le travail étudie l'évolution de la pression pulsée (PP), de la fréquence cardiaque (FC) et du double produit PPxFC lors d'un test d'accroupissement (« squatting ») chez des patients diabétiques de type 1 (DT1) des deux sexes, en fonction de la durée de la maladie, et chez des sujets témoins non diabétiques (TND).

Méthodes :

PP et FC sont mesurées en continu pendant 3 x 1 min lors d'un test postural (debout, accroupi, debout) avec un Finapres® chez 160 DT1, répartis en 4 groupes de 40 sujets (20 hommes, 20 femmes) en fonction de l'âge : G1: 20-30 ans; G2: 31-40 ans; G3: 41-50 ans; G4: 51-60 ans. Les résultats sont comparés à ceux obtenus chez 4 x 40 TND appariés. Les valeurs moyennes de PP, FC et PPxFC sont comparées en position debout initiale et en delta lors de l'accroupissement.

Résultats :

En position debout, PP augmente plus ($p=0,002$) et FC diminue moins ($p=0,011$) avec l'âge chez DT1 que chez TND, conduisant à des valeurs plus élevées de PPxFC chez G2 ($p=0,008$), G3 ($p=0,0004$) et G4 ($p=0,0137$). Lors de l'accroupissement, PP augmente avec l'âge chez DT1 ($p<0,001$), mais pas chez TND (NS), tandis que la diminution de FC s'atténue avec l'âge chez DT1 et TND ($p<0,001$). Le produit PPxFC augmente donc nettement avec l'âge, davantage chez DT1 que TND : chez G4, + 915 versus + 519 mm Hg/min ($p=0,0399$), surtout suite à un plus grand delta PP (+ 12 vs + 7 mm Hg, $p = 0,0084$). La corrélation de PP avec l'âge est la plus forte chez les femmes DT1 ($r=0,42$; $p=0,0001$).

Conclusion :

Les patients DT1 sont caractérisés par une augmentation plus marquée du produit PPxFC en fonction de l'âge, chacune des composantes étant un facteur de risque reconnu de complications cardio-vasculaires

Réserve au secrétariat	Réserve au secrétariat
	<p>Jean-Christophe Philips, Monique Marchand, André J. Scheen (1) (1) Service de Diabétologie, Nutrition et Maladies métaboliques, CHU Sart Tilman, Université de Liège, Liège, Belgique.</p>
<p>Réserve au secrétariat</p> <p>A titre indicatif, TITRE = 200 caractères maxi. (espaces compris)</p> <p>A titre indicatif, RESUME = 2000 caractères maxi. (espaces compris)</p>	<p>AUGMENTATION DE LA PRESSION PULSEE (PP) ET DU DOUBLE PRODUIT « PP x FREQUENCE CARDIAQUE » CHEZ LE PATIENT DIABETIQUE DE TYPE 1 EN FONCTION DE L'AGE</p> <p>Objectifs : Le travail étudie l'évolution de la pression pulsée (PP), de la fréquence cardiaque (FC) et du double produit PPxFC lors d'un test d'accroupissement (« squatting ») chez des patients diabétiques de type 1 (DT1) des deux sexes, en fonction de la durée de la maladie, et chez des sujets témoins non diabétiques (TND).</p> <p>Méthodes : PP et FC sont mesurées en continu pendant 3 x 1 min lors d'un test postural (debout, accroupi, debout) avec un Finapres® chez 160 DT1, répartis en 4 groupes de 40 sujets (20 hommes, 20 femmes) en fonction de l'âge : G1: 20-30 ans; G2: 31-40 ans; G3: 41-50 ans; G4: 51-60 ans. Les résultats sont comparés à ceux obtenus chez 4 x 40 TND appariés. Les valeurs moyennes de PP, FC et PPxFC sont comparées en position debout initiale et en delta lors de l'accroupissement.</p> <p>Résultats : En position debout, PP augmente plus ($p=0,002$) et FC diminue moins ($p=0,011$) avec l'âge chez DT1 que chez TND, conduisant à des valeurs plus élevées de PPxFC chez G2 ($p=0,008$), G3 ($p=0,0004$) et G4 ($p=0,0137$). Lors de l'accroupissement, PP augmente avec l'âge chez DT1 ($p<0,001$), mais pas chez TND (NS), tandis que la diminution de FC s'atténue avec l'âge chez DT1 et TND ($p<0,001$). Le produit PPxFC augmente donc nettement avec l'âge, davantage chez DT1 que TND : chez G4, + 915 versus + 519 mm Hg/min ($p=0,0399$), surtout suite à un plus grand delta PP (+ 12 vs + 7 mm Hg, $p = 0,0084$). La corrélation de PP avec l'âge est la plus forte chez les femmes DT1 ($r=0,42$; $p=0,0001$).</p> <p>Conclusion : Les patients DT1 sont caractérisés par une augmentation plus marquée du produit PPxFC en fonction de l'âge, chacune des composantes étant un facteur de risque reconnu de complications cardio-vasculaires.</p>

Commentaire [MM1]: 300 mots

Age (années)	G1 20-30		G2 31-40		G3 41-50		G4 51-60		P Anova G1-G4	
	DT1	TND	DT1	TND	DT1	TND	DT1	TND	DT1	TND
PP (mm Hg)	48 ± 13	50 ± 11	52 ± 10	48 ± 9	60 ± 12	54 ± 13	58 ± 17	53 ± 14	0,0004	NS
FC (bpm)	89 ± 14	86 ± 9	93 ± 12	81 ± 10	88 ± 11	82 ± 10	85 ± 13	79 ± 10	NS	0,0004
Produit PP x FC (mm Hg*min⁻¹)	4293 ± 1316	4405 ± 1095	4798 ± 1033	4014 ± 890	5286 ± 1260	4351 ± 996	5024 ± 1916	4146 ± 1170	NS	NS
Delta PP (mmHg)	5 ± 7	4 ± 7	7 ± 6	7 ± 6	8 ± 7	5 ± 7	12 ± 10	7 ± 6	0,0001	NS
Delta FC (bpm)	-10 ± 8	-9 ± 6	-10 ± 9	-7 ± 9	-7 ± 7	-5 ± 8	-3 ± 8	-1 ± 7	0,00008	0,0004
Delta produit PPxFc (mmHg*min-1)	-35 ± 597	-82 ± 488	101 ± 688	221 ± 456	348 ± 634	170 ± 694	915 ± 1043	519 ± 579	0,00001	0,00001