

Second Belgian Pharmaceutical Care Symposium (septembre 15, 2012)

Sujet : soins pharmaceutiques en milieu ambulatoire.

Titre : Evaluation des connaissances et des comportements des parents et des pharmaciens dans le cadre de la prise en charge de la fièvre chez l'enfant.

Auteurs: Blavier Fanny¹, Van Hees Thierry², Philippe Geneviève².

1 Université de Liège, Faculté de Médecine, Département des Sciences de la Santé Publique

2 Université de Liège, Faculté de Médecine, Département de Pharmacie

Orateur : Fanny Blavier, e-mail : fannyblavier@hotmail.com

Contact : G. Philippe, Université de Liège, CHU, B36, Avenue de l'Hôpital, 1, 4000 Liège – Tél : 04 366 98 66 – e-mail : g.philippe@ulg.ac.be

Introduction : Durant les trois premières années de sa vie, un enfant subit en moyenne 6 à 10 maladies infectieuses par an, s'accompagnant souvent de fièvre. Face à ce symptôme, les parents sont bien souvent démunis et ressentent le besoin d'informations fiables pour traiter la fièvre efficacement.

Objectif : Evaluer les connaissances et les comportements des parents face à la fièvre de leur enfant. Evaluer le rôle du pharmacien dans cette prise en charge.

Méthode : Deux enquêtes par questionnaire ont été réalisées en parallèle : une auprès des parents et une auprès des pharmaciens. Les parents ont été recrutés au sein de trois maisons médicales de la ville de Liège. Ils ont été amenés à répondre à un questionnaire auto-administré comportant 16 questions sur la fièvre chez l'enfant et son traitement. La seconde étude s'est intéressée au rôle du pharmacien et sa réaction lorsque des parents venaient chercher des informations sur les antipyrétiques pédiatriques. Cette enquête s'est déroulée, par questionnaire auto-administré, dans les officines entourant les maisons médicales étudiées.

Résultats : Pour la première étude, 62 parents ont répondu au questionnaire. 87 % des parents ont cité le thermomètre rectal comme thermomètre adéquat pour prendre la température, mais seulement 44% d'entre eux traitaient la fièvre à partir du seuil de 38,5°C (la plupart des parents, en particulier lorsqu'il s'agit d'un premier enfant, mettent en œuvre un traitement pharmacologique avant que cette température de traitement théorique ne soit atteinte). En ce qui concerne le choix des médicaments à administrer en cas de fièvre, 75% des parents citaient le paracétamol comme médicament de première intention, par contre seuls 37% ont pu citer l'ibuprofène comme médicament de seconde intention. Comme source d'information concernant le traitement de la fièvre de leur enfant, les parents ont cité le pharmacien en 4^e position (après le médecin traitant, l'ONE et le pédiatre).

Pour la seconde étude, 36 pharmaciens ont répondu au questionnaire. Il en

ressort que tous étaient amenés, au moins une fois par jour en moyenne, à donner des informations sur les antipyrétiques pédiatriques, que ce soit de façon spontanée ou suite à une demande du patient.

Conclusion : Les parents possèdent des connaissances de base, mais aussi certaines lacunes, identifiées au cours de cette étude, en ce qui concerne la fièvre et son traitement chez l'enfant. Le rôle d'informateur du pharmacien est important car il est en première ligne quand les parents viennent chercher un antipyrétique pédiatrique sans avoir consulté auparavant le corps médical. Il lui appartient d'orienter les conseils prodigués en fonction des lacunes détectées au sein de la patientèle.