


FIG. XXIII. — Carte phytosociologique au 10.000 m<sup>e</sup>. (en couleur)







FIG. XXIII. — Carte phytosociologique au 10.000 m<sup>e</sup>. (en couleur)



NORD - EST

NE.

FAGNE DE CLEFAY.




FIG. XXII. — Coupe en travers des deux formations tourbeuses, et analyses polliniques sommaires.

ginato-sphagnetum recurvi cariceto-vaccinietosum  
diginosi.

sphagnetum medio-rubell vaginetosum.

restiges de forêt de feuillus.

antation d'épicées.

Tourbe :

arbre à Carex ?

16. Souche de chênes.
17. Tourbe à bouleaux pubescents.
18. Tourbe à *Eriophorum vaginatum*.
19. Horizon dense à *Eriophorum vaginatum*.
20. Tourbe à *Eriophorum vaginatum*, *Vaccinium uliginosum* et *Betula pubescens*.

21. Tourbe à *Sphagnum imbricatum* et *Eriophorum vaginatum*.
22. Tourbe à *Sphagnum trib. acutifolia* et *Eriophorum vaginatum*.
23. Tourbe à *Narthecium ossifragum*.
24. Horizon de surface à *Sphagnum papillosum* et *Narthecium ossifragum*.
25. Horizon de surface à *Sphagnum medium* et *S. papillosum*.

Analyses polliniques sommaires :

26. Conifères.
  27. Bouleaux.
  28. Chênaie mixte.
  29. Aulnes.
  30. Noisetier
  31. Hêtre.
- Le pourcentage du noisetier est calculé en fonction du total du pollen forestier restant.  
Les spores de sphaignes et le pollen d'Ericacées sont calculés en fonction du total du pollen forestier (moins le noisetier).