

## Correspondance

*Nouvelles annales de mathématiques 2<sup>e</sup> série*, tome 17 (1878), p. 325.

<[http://www.numdam.org/item?id=NAM\\_1878\\_2\\_17\\_\\_325\\_1](http://www.numdam.org/item?id=NAM_1878_2_17__325_1)>

© Nouvelles annales de mathématiques, 1878, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/legal.php>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme  
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

---

---

## CORRESPONDANCE.

---

1. Une solution de la question 1252, déjà résolue (p. 231, numéro de mai), nous a été adressée, de Berlin, par M. Kruschwitz.

2. Extrait d'une lettre de M. Catalan :

« La question (1257) est un théorème de *Miquel*, publié d'abord dans le *Géomètre* (1836) ; puis, dans le *Journal de M. Liouville* (t. III, p. 486 ; 1838). Je l'ai reproduit dans les diverses éditions des *Théorèmes et Problèmes de Géométrie élémentaire*. » •