

population ne se situent pas qu'en deuxième ou troisième ligne, mais également en première ligne. »

D'autres difficultés à surmonter

Le changement ne sera pas facile. D'autant plus que la couverture des soins de santé n'est pas universelle en Guinée. Un autre cheval de bataille pour le médecin de famille. « *Seules les grandes entreprises ou les industriels peuvent se permettre une assurance privée. Il n'y a pas d'accès universel aux soins. Est-ce que nous pourrions y arriver ? Ce ne sera pas facile, mais ce serait salutaire pour le pays. Car la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. En Guinée, pour se soigner, certains sont capables de tout vendre pour recouvrer leur santé.* »

À ce problème s'ajoutent encore d'autres difficultés à surmonter : l'accès à des médicaments de qualité, contrôlés, l'amélioration de la prévention, l'introduction de la multidisciplinarité au sein des pratiques. « *Les défis sont nombreux, mais pas insurmontables* », indique le Dr Diallo, optimiste. « *Grâce au concours de l'ULB, mais aussi de l'ULiège, d'universités canadiennes, la faculté de médecine de l'Université de Conakry compte recruter cette année la deuxième promotion de médecins de famille et un appel à candidature sera lancé à cet effet. Je suis optimiste, car la continuité est assurée pour quatre années. Dans un premier temps, un binôme médecin expatrié/médecin local pourra collaborer au sein de la première ligne, avant que nous puissions reprendre la main quand nous sentirons que nous sommes capables.* »

Que du négatif ?

Le tableau dépeint est sombre. Mais l'optimisme du Dr Diallo et la démocratie naissante en Guinée laissent entrevoir un avenir meilleur. Il y a d'ailleurs des bonnes pratiques à apprendre de la Guinée. Notamment en ce qui concerne le rôle de la famille dans les soins. « *En Belgique, la famille n'est pas présente dans les soins alors qu'en Guinée, elle est fortement impliquée. L'entourage du patient est très important. En Belgique, vous avez remplacé la famille par des aides familiales, des assistants sociaux. Soit autant de personnes méconnues du patient. La relation de confiance est difficile à établir. La famille est irremplaçable au chevet du patient.* »

Laurent Zanella

>>> Le pays a été sévèrement touché par le virus Ebola. Découvrez l'expérience du Dr Thierno Mouctar Diallo sur cet événement sur notre site.

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Pantomed 20 mg comprimés gastro-résistants Pantomed 40 mg comprimés gastro-résistants COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Pantomed 20 mg : Chaque comprimé gastro-résistant contient 20 mg de pantoprazole (sous forme de pantoprazole sodique sesquihydraté). Pantomed 40 mg : Chaque comprimé gastro-résistant contient 40 mg de pantoprazole (sous forme de pantoprazole sodique sesquihydraté). FORME PHARMACEUTIQUE Comprimé gastro-résistant (comprimé). Pantomed 20 mg : Comprimé enrobé jaune, ovale et biconvexe, portant sur une face « P20 ». Imprimé à l'encre brune. Pantomed 40 mg : Comprimé enrobé jaune, ovale et biconvexe, portant sur une face « P40 » imprimé à l'encre brune. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES Pantomed 20 mg : Pantomed est indiqué pour traiter les adultes et adolescents âgés de 12 ans et plus pour : Le reflux gastro-œsophagien symptomatique ; La prise en charge à long terme et la prévention des récurrences d'œsophagite par reflux gastro-œsophagien. Pantomed est indiqué dans le traitement chez l'adulte pour : La prévention d'ulcères gastro-duodénaux induits par les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) non sélectifs chez des patients à risque ayant besoin d'un traitement continu par AINS. Pantomed 40 mg : Pantomed est indiqué dans le traitement chez l'adulte et l'adolescent âgé de 12 ans et plus pour : L'œsophagite par reflux gastro-œsophagien. Pantomed est indiqué chez l'adulte pour : L'éradication de *Helicobacter pylori* (H. pylori) en association à une bithérapie antibiotique appropriée chez les patients présentant un ulcère

situations hypersécrétoires pathologiques n'est pas limitée dans le temps et doit être adaptée aux besoins cliniques. Patients avec insuffisance hépatique. La dose journalière de 20 mg de pantoprazole (1 comprimé de 20 mg pantoprazole) ne doit pas être dépassée chez le sujet atteint d'insuffisance hépatique sévère. Les données de sécurité et d'efficacité disponibles, lors de l'utilisation du Pantomed dans le cadre d'une association thérapeutique, étant limitées, Pantomed ne doit pas être utilisé pour l'éradication de H. pylori chez les patients présentant une insuffisance hépatique modérée à sévère. Patients avec insuffisance rénale Aucune adaptation de la dose n'est nécessaire chez le sujet atteint d'insuffisance rénale. Les données de sécurité et d'efficacité disponibles, lors de l'utilisation du Pantomed dans le cadre d'une association thérapeutique, étant limitées, Pantomed ne doit pas être utilisé pour l'éradication de H. pylori chez les patients présentant une insuffisance rénale. Sujets âgés Aucune adaptation de la dose n'est nécessaire chez les sujets âgés. Populations pédiatriques L'utilisation de Pantomed n'est pas recommandée chez l'enfant âgé de moins de 12 ans en raison de l'insuffisance des données de sécurité et d'efficacité dans cette tranche d'âge. Mode d'administration Usage oral. Les comprimés ne doivent pas être croqués ou écrasés et doivent être avalés en entier avec un peu d'eau une heure avant un repas.

	20 mg	40 mg
28 compr.	€ 8,64	€ 12,96
56 compr.	€ 12,77	€ 22,69
100 compr.	€ 17,98	€ 29,74

CONTRE-INDICATIONS Hypersensibilité à la substance active, aux benzimidazoles substitués, ou à l'un des excipients. EFFETS INDÉSIRABLES Environ 5 % des patients sont susceptibles de présenter des effets indésirables (E). Les E les plus souvent signalés sont une diarrhée et des céphalées, survenant tous deux chez environ 1 % des patients. Les effets indésirables signalés avec le pantoprazole sont classés dans le tableau ci-dessous selon l'ordre de fréquence suivant : Très fréquents (>1/10) ; fréquents (>1/100 à <1/10) ; peu fréquents (>1/1000 à <1/100) ; rares (>1/10000 à <1/1000) ; très rares (<1/10000) ; fréquence indéterminée (ne peut être estimée d'après les données disponibles). Pour tous les effets indésirables notifiés après commercialisation, il n'est pas possible d'imputer cet ordre de fréquence, par conséquent ils sont listés comme survenant à une fréquence « indéterminée ». Dans chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés par ordre de gravité décroissante. Tableau 1. Effets indésirables du pantoprazole rapportés au cours des études cliniques et notifiés après commercialisation Affections hématologiques et du système lymphatique Rares : Agranulocytose - Très rares : Thrombopénie ; Leucopénie ; Pancytopenie Affections du système immunitaire Rares : Hypersensibilité (y compris réactions anaphylactiques et choc anaphylactique). Troubles du métabolisme et de la nutrition Rares : Hyperlipidémie et augmentation des lipides (triglycérides, cholestérol) ; variations de poids - Fréquence indéterminée : Hyponatrémie ; Hypomagnésémie ; Hypocalcémie⁽¹⁾ ; Hypokaliémie. Affections psychiatriques Peu fréquents : Troubles du sommeil - Rares : Dépression (et autres aggravations) - Très rares : Désorientation (et autres aggravations) - Fréquence indéterminée : Hallucinations, confusion (en particulier chez les patients prédisposés, ainsi que l'aggravation de ces symptômes lorsqu'ils sont préexistants). Affections du système nerveux Peu fréquents : Céphalées ; vertiges - Rares : Troubles du goût - Fréquence indéterminée : Affections gastro-intestinales Fréquents Polypes des glandes fundiques (bénins) - Peu fréquents : Diarrhée, nausées / vomissements ; distension abdominale et ballonnements ; constipation ; sécheresse de la bouche ; douleur et gêne abdominale. Affections hépatobiliaires Peu fréquents : Elevations des enzymes hépatiques (transaminases, γ-GT) - Rares : Augmentation de la bilirubine - Fréquence indéterminée : Lésion hépatocellulaire ; ictère ; insuffisance hépatocellulaire. Affections de la peau et du tissu sous-cutané Peu fréquents : Rash cutané / exanthème / éruption ; prurit - Rares : Urticaire ; œdème de Quincke - Fréquence indéterminée : Syndrome de Stevens-Johnson ; syndrome de Lyell ; érythème polymorphe ; photosensibilité ; Lupus érythémateux cutané subaigu. Affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif Peu fréquents : Fracture de la hanche, du poignet et de la colonne vertébrale - Rares : Arthralgies ; myalgies - Fréquence indéterminée : Spasmes musculaires⁽²⁾ Affections du rein et des voies urinaires Fréquence indéterminée : Néphrite interstitielle (avec une possible progression vers une insuffisance rénale). Affections des fonctions reproductives et du sein Rares : Gynécomastie. Troubles généraux et anomalies au site d'administration Peu fréquents : Asthénie, fatigue et malaise - Rares : Elevation de la température corporelle ; œdème périphérique. (1) Hypocalcémie en association avec une hypomagnésémie (2) Spasme musculaire suite à des troubles électrolytiques Déclaration des effets indésirables suspects La déclaration des effets indésirables suspects après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice / risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Belgique Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Division Vigilance EUROSTATION II Place Victor Horta, 40 / 40 B-1060 Bruxelles Site internet : www.afmps.be e-mail : adversedrugreactions@afmps.be Luxembourg / Luxembourg Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des Médicaments Villa Louvigny - Allée Marconi L-2120 Luxembourg Site internet : http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html NATURE ET CONTENU DE L'EMBALLAGE EXTERIEUR Pantomed 20 mg : Emballages : flacons (flacon en HDPE avec une fermeture en LDPE) de 100 comprimés gastro-résistants et plaquettes (Alu / Alu sans renforcement en carton) de 7, 28, 56 et 100 comprimés gastro-résistants Emballages hospitaliers : plaquettes (Alu / Alu sans renforcement en carton) de 50 comprimés gastro-résistants Pantomed 40 mg : Flacons et fermetures en polyéthylène. Plaquettes thermoformées Alu / Alu sans renforcement en carton. Emballages de 7, 28, 56 et 100 comprimés gastro-résistants Emballage hospitalier avec 50 comprimés gastro-résistants TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Takeda Belgium L. Da Vinci-iaan 7 1930 Zaventem Belgique NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Pantomed 20 mg : Flacon : BE318263 Plaquette BE318254 Pantomed 40 mg : Flacon : BE318281 Plaquette : BE318272 MODE DE DELIVRANCE Médicament soumis à prescription médicale. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 07/2017 Des informations détaillées sur ces médicaments sont disponibles sur le site internet des Heads of Medicines Agencies (HMA) http://www.hma.eu.

Prescrire
100% original et bon marché*
les yeux fermés avec
Pantomed



Pantomed fait partie des IPP les moins chers* et c'est bon pour votre profil !

EMBALLAGES	DOSAGE/COMPR.	CHAP.	CAT.	BON POUR VOTRE PROFIL
	20mg / 28 compr.	II	C	
	20 mg / 56 compr.	II	B	
	20mg / 100 compr.	II	B	
	40 mg / 28 compr.	II	C	
	40 mg / 56 compr.	II	B	

L'emballage de Pantomed 40mg 100 compr. est remboursé en catégorie Af (traitement de Zollinger-Ellison ou post-traitement d'une ablation par radiofréquence de la muqueuse de Barrett)

*Prix juin 2018

Pantomed. Votre IPP complet.

PANTOMED
PANTOPRAZOLE

né : Paresthésie Affections oculaires Rares : Troubles de la vue / vision floue. Affections gastro-intestinales Fréquents Polypes des glandes fundiques (bénins) - Peu fréquents : Diarrhée, nausées / vomissements ; distension abdominale et ballonnements ; constipation ; sécheresse de la bouche ; douleur et gêne abdominale. Affections hépatobiliaires Peu fréquents : Elevations des enzymes hépatiques (transaminases, γ-GT) - Rares : Augmentation de la bilirubine - Fréquence indéterminée : Lésion hépatocellulaire ; ictère ; insuffisance hépatocellulaire. Affections de la peau et du tissu sous-cutané Peu fréquents : Rash cutané / exanthème / éruption ; prurit - Rares : Urticaire ; œdème de Quincke - Fréquence indéterminée : Syndrome de Stevens-Johnson ; syndrome de Lyell ; érythème polymorphe ; photosensibilité ; Lupus érythémateux cutané subaigu. Affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif Peu fréquents : Fracture de la hanche, du poignet et de la colonne vertébrale - Rares : Arthralgies ; myalgies - Fréquence indéterminée : Spasmes musculaires⁽²⁾ Affections du rein et des voies urinaires Fréquence indéterminée : Néphrite interstitielle (avec une possible progression vers une insuffisance rénale). Affections des fonctions reproductives et du sein Rares : Gynécomastie. Troubles généraux et anomalies au site d'administration Peu fréquents : Asthénie, fatigue et malaise - Rares : Elevation de la température corporelle ; œdème périphérique. (1) Hypocalcémie en association avec une hypomagnésémie (2) Spasme musculaire suite à des troubles électrolytiques Déclaration des effets indésirables suspects La déclaration des effets indésirables suspects après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice / risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Belgique Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Division Vigilance EUROSTATION II Place Victor Horta, 40 / 40 B-1060 Bruxelles Site internet : www.afmps.be e-mail : adversedrugreactions@afmps.be Luxembourg / Luxembourg Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des Médicaments Villa Louvigny - Allée Marconi L-2120 Luxembourg Site internet : http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html NATURE ET CONTENU DE L'EMBALLAGE EXTERIEUR Pantomed 20 mg : Emballages : flacons (flacon en HDPE avec une fermeture en LDPE) de 100 comprimés gastro-résistants et plaquettes (Alu / Alu sans renforcement en carton) de 7, 28, 56 et 100 comprimés gastro-résistants Emballages hospitaliers : plaquettes (Alu / Alu sans renforcement en carton) de 50 comprimés gastro-résistants Pantomed 40 mg : Flacons et fermetures en polyéthylène. Plaquettes thermoformées Alu / Alu sans renforcement en carton. Emballages de 7, 28, 56 et 100 comprimés gastro-résistants Emballage hospitalier avec 50 comprimés gastro-résistants TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Takeda Belgium L. Da Vinci-iaan 7 1930 Zaventem Belgique NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Pantomed 20 mg : Flacon : BE318263 Plaquette BE318254 Pantomed 40 mg : Flacon : BE318281 Plaquette : BE318272 MODE DE DELIVRANCE Médicament soumis à prescription médicale. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 07/2017 Des informations détaillées sur ces médicaments sont disponibles sur le site internet des Heads of Medicines Agencies (HMA) http://www.hma.eu.

Takeda