

## Extension de l'aire de répartition de *Burmannia congesta* (Wright) Jonker (*Burmanniaceae*)

En janvier 1986, au cours d'une prospection de forêt marécageuse, à une centaine de km au nord de Kolwezi, dans une région rarement visitée par les botanistes, nous avons découvert, émergeant à peine de la litière recouvrant un sol très vaseux, une petite plante saprophyte entièrement blanche, *Burmannia congesta*, dont c'est la première récolte au Shaba, bien éloignée (plus de 1000 km) des 3 autres récoltes connues du Zaïre. C'est aussi la récolte la plus méridionale de l'aire de répartition de l'espèce, qui se présente comme suit (fig. 2):




Fig. 2. — Distribution de *Burmannia congesta* (Wright) Jonker.

*Burmannia congesta* (Wright) Jonker, Meded. Bot. Mus. Herb. Rijksuniv. Utrecht 51: 94 (1938); Hepper in Hutch. & Dalz., Fl. W. Trop. Afr., ed. 2, 3: 179 (1968); Geerinck, Fl. Congo, Rwanda & Burundi, *Burmann.*: 3 (1970).

*B. densiflora* Schlechter, Engl. Bot. Jahrb. 38: 141 (1906); Jonker, op. cit.: 95 (1938); Hepper in Hutch. & Dalz., op. cit.: 179 (1968).

*Distribution*: Distr. Pl. Afr. 34: carte 1154 (1987).

LIBERIA: Nimba, Adam 26570 (P); Wanau (près de Ganta), Harley 2060 (K); Gbanga, Linder 1216 (K).

GHANA: Ankassa For. Res., Hall & Enti GC 36371 (K).

NIGERIA: Nun River, Mann 515 (K holotype de *B. congesta*); Oban For. Res., Orem, Onochie & Okafor FHI 36132 (K); Oban, Talbot 716 (BM).

CAMEROUN: Rés. For. Kienke, Bamps 1656 (BR); Efulen, région de Bale, Bates 370 (BM, G, K); Kribi-Ebolowa, Bos 3443 (BR, K, P, WAG); riv. Lobé, Bos 4818 (WAG); 20 km Kribi, Bos 6291 (WAG); Edea, Sende, Buesgen 467 (B); ca. 40 km NW Eseka, riv. Kélé, W. de Wilde 1466 (WAG); Nkolbisson, W. de Wilde 1677 (P, WAG), 1677a (BR, K, WAG), 1677c (WAG); Grand Batanga, Dinklage 848, 963 (B); Korup Forest, env. Mudemba, Hepper 8624 (K); Nkolebunde, près de Malende, Ledermann 990 (B); 20 km SSE Zingui, Letouzey 9050 (P); Mapuli, 30 km ENE Edéa, Letouzey 12399 (P); Mékoossi, 24 km SW Ambam, Raynal 9949 (P); près de Moliwe, Stammer s.n. (B); Douala-Edéa, D. Thomas 174 (K); Bipinde, Zenker 4357 (BR, K, P).

GABON: Kinguélé, J. de Wilde et al. 206 (WAG); route de Kinguélé, Hallé 4569 (P); St. Martin, Le Testu 5936 (BM, BR, P); Bissok, Le Testu 8976 (P).

RÉP. CENTRAFRICAINE: Yalinga, Le Testu 4007 (P), s.n. (BM, BR); riv. Ouaoa, entre Grimari et Fort Sibut, Tisserant 75 (P).

ANGOLA: Cabinda, riv. Zanza, Mbulu Hill, Gossweiler 8240 (BM).

ZAÏRE:

DISTRICT DU BAS-CONGO: Dembo, Gillet s.n. (BR).

DISTRICT FORESTIER CENTRAL: Yambao, riv. Lotole, J. Léonard 1620 (BR); ibid., riv. Lombo, Louis 15425 (BR).

DISTRICT DU HAUT-KATANGA: Kolwezi-Luena, km 114, riv. Mutendele, Bamps & Malaisse 8211 (BR, K).

Outre les échantillons examinés dans l'herbier BR et ceux reçus en consultation de Wageningen (WAG), lors du passage à BR de F.J. Breteler, nous avons ajouté les échantillons cités dans la monographie de F.P. Jonker (op. cit. 1938), ainsi que les informations complémentaires fournies de Kew par G. V. Pope et de Paris par P. Sita, que nous remercions bien sincèrement pour leur aide.

P. Bamps & F. Malaisse,  
*Jardin botanique national de Belgique*