

1

Insectes intéressants
récoltés par le "Cercle des Entomologistes liégeois"

Les espèces rares ou très rares seront désignées par * ou **. La mention "C ou AC etc., dans la région liégeoise" ou "dans la région calcaire etc.", sera considérée comme concluante, après une dizaine d'années d'observation, et permettra de ne plus mentionner l'espèce dans les listes suivantes.

Les auteurs des captures seront désignés comme suit :

G. A. = G. ALLARD, BH. = P. BALHAN, CA = F. CARPENTIER, F. D. = F. DARIMONT, G. D. = G. DEMOULIN, D. = J. DEPRÉ, E. = R. ENCKELS, J. L. = J. LECLERCQ, L. = R. LERUTH, MA. = P. MARÉCHAL, MU. = J. MULLER, P. = L. PETIT.

COLÉOPTÈRES

Ces insectes ont été revus ou déterminés par M. F. GUILLEAUME, de Bruxelles, à qui nous renouvelons nos meilleurs remerciements.

Anobiïdes.

Anobium denticolle PANZ. — Sous l'écorce d'un vieux Pin, Chaudfontaine, 21-III-37. (J. L.).

Ptinides.

Ptinus latro F. — Montagne St.-Pierre, 9-V-37. (G. A.)

**P. sexpunctatus* PANZ. — 1 exemplaire à la lampe, Liège, 28-V-37. (MA).

Téléphorides.

Telephorus pallidus GOEZE. (= *bicolor* PANZ.). — Beyne, 22-V-37. (J. L.).

***Dictyopterus minutus* F. — Quelques exemplaires, Oival, IX-1937. (CA.). Cette jolie et rare espèce "n'a encore été trouvée qu'une seule fois, aux environs de Liège" (F. GUILLEAUME).

Clérides.

Tanasimus (= *Clerus*) *formicarius* L. — Beyne, 15-III-37 et XI-38. (J. L.).

**Trichodes alvearius* F. — Malmédy, 14-VII-38. (MA.).

Lambillonia 1938 . V. 38

Elatérides.

- **Elater cinnabarinus* ESCHSCH. — Beverloo, février (L.), Wéris, 30-VIII-37. (G. A.).
Pheletes aeneoniger DE G. — Spécial à la Haute Belgique calcaire où il est AC; Beyne, 25 et 29-V-37. (J. L.); Angleur, 3-VI-37. (MA.).
Corymbites pectinicornis L. — Xhoffraix, 10-VI-36. (BH.).

Buprestides.

- Anthaxia quadripunctata* L. — AC région calcaire sur fleurs de Composées liguliflores (*Leontodon*, *Taraxacum*, *Hypochoeris*), Beyne, Bellaire, VI et VII-1937. (J. L.).
Agrilus angustulus ILL. — AC région liégeoise: Beyne, 17-VII-37. (J. L.).
A. Roberti CHEVR. (= *pratensis* RATZ.). — 2 exemplaires Sart-Tilman (Angleur), 12-VII-37 (CA.).
**A. scaberrimus* RATZ. — Bois de Tilff, 22-VI-37 (MA.).

Dermestides.

- Megatoma undata* L. — CC au pays de Herve: Beyne, Bellaire, Fléron, Ensival, Jupille, Chaudfontaine; en hiver (I à III-37) sous les écorces, d'Aubépine surtout, dans les galeries de Xylophages et dans les vieux nids d'Hyménoptères rubicoles; plus tard, en VI-VII, sur les fleurs d'Ombellifères. (J. L.).

Hydrophilides.

- **Helophorus dorsalis* MARSH. — Beyne, 22-V-37. (J. L.).
Hydrophilus piceus L. — 1 exemplaire dans un étang à Wandre, un autre dans un petit ruisseau à Bellaire, tous deux en V-1936; un 3^e dans une flaque d'eau, sur les bords de la "Vieille Meuse" à Wandre, 29-IV-37. (J. L.). (Bh.)
**Cercyon obsoletus* GYLL. — Beyne, 6-IV-37. (J. L.).

Nitidulides.

- **Trogosita mauritanica* L. — Espèce cosmopolite; Beyne, 11-III-37. (J. L.).
Epuraea pusilla ILL. — Beyne (maison). 19-V-37. (J. L.). AC région liégeoise,

Meligethes difficilis HERBST. — Bellaire, 11-IV-37. (J. L.).

**Meligethes lugubris* STURM. — Loën, 23-V-37. (J. L.).

Cisides.

Cis nitidus HERBST. — Sur Polypores du Hêtre, Chaudfontaine, 12-XII-37. (J. L.).

Colydiides.

Ditoma crenata F. — Sous l'écorce d'un vieux Frêne, 3 exemplaires Fléron, 3-I-37, un 4^e Bellaire, 11-XI-38. (J. L.).

Endomychides.

♀. **Endomychus coccineus* L. — 2 exemplaires à Beyne, tous deux tombés dans un tonneau d'eau, l'un 23-VIII-37, l'autre 1-VI-38. (J. L.).

Coccinellides.

Coccinella quadripunctata PONT. — Chaudfontaine, 28-III-37. (J. L.).

Cucujides.

♀. **Uleiota planata* L. — ♂ ♀ C à Amay, sous l'écorce de Hêtres et de Chênes abattus: III-IV-37 (parmi des fourmis), VII, VIII et XII-37. (G. D.).

Silvanus surinamensis L. — Cosmopolite; dans de vieilles amandes, Beyne 12-XII-37. (J. L.).

Cerambycides.

Criocephalus rusticus L. — Amay, 28-VIII-37. (G. D.).

♀. *Cerambyx Scopoli* FUESSL. — Bellaire, 17-V-37 (J. L.). — AC région liégeoise.

Stenopterus rufus L. — Vraiment C région calcaire, notamment sur les *Cirsium*; Bellaire, Beyne, Jupille, etc. en VI-VII. (J. L.).

Leptura rubra L. — Devenu AC région liégeoise; ♂ ♀ Francorchamps 31-VII-38, sur *Angelica silvestris* L.; 1 ♀ Beyne 17-VII-37. (J. L.).

♀. *Aromia moschata* L. — ♂ ♀ Beyne 30-VII et 5-VIII-38 (J. L.); 1 ♂ Amay, 5-VIII-37. (G. D.).

Xylotrechus arvicola OL. — Eben 25-VII-38. (MA.).

**Mesosa nebulosa* F. — Est AC à Beyne, sur les murs, les arbres, par terre et même dans une habitation: 22-V-37; 7, 12 et 28-V-38. (J. L.).

Agapanthia villosa-viridescens DE G. — C région liégeoise, notamment sur les *Cirsium*, Beyne, 30-VI-36. (J. L.).

Phytoecia cylindrica L. — Argenteau, 7-VI-37 (J. L.); AC région liégeoise.

Chrysomélides.

Cryptocephalus flavipes F. — Sur un Tilleul, ♂ ♀ in copula, Brialmont (Tilff), 12-VI-37. (MA.).

Cryptocephalus parvulus MÜLL. — AC région liégeoise, Beyne, etc. en VI. (J. L.).

Haltica quercetorum FOURCR. — C à Beyne, Bellaire et Chaudfontaine dans les bois de Chênes, en hiver sous les feuilles tombées et sous les pierres; en V et VI sur ces arbres. (J. L.).

Phytodecta rufipes DE G. — 2 exemplaires Wéris, 15-V-37. (G. A.).

Cassida stigmatica SUFF. — Wéris, 3-VIII-37. (G. A.).

Curculionides.

Balaninus pellitus BOH. — Wéris, 9-VIII-35. (G. A.).

Scolytides.

Scolytus mali BECHST. (= *pruni* RATZ.). — Beyne, 31-III-37. (J. L.).

***Xyloniites retusus* OL. — Belg. nov. sp.; quelques exemplaires dans une remise à fagots, à Goffontaine, en VI-38. (CA., det. L. FRENNET).

Mélandryides.

Melandrya caraboides L. — AC région calcaire. Bois de Yernée, sur un Hêtre. 13-IX-37 (G. D.); Loën, 7-VI-38. (J. L.).

Mordellides.

Mordella leucaspis KÜST. — Châtelet, 14-VII-37. (J. L.).

Tomoxia biguttata GYLL. — Quelques exemplaires sur un vieux piquet, Les Croisettes (Trooz), 27-VI-37. (MA).

Mordellistena lateralis OL. — Loën, 4-VII-37 (J. L.) ; Julémont, 17-VII-38. (MU).

Lagriides.

***Rhinosimus viridipennis* LATR. — Beyne, 1-II-37, sur un vieil Osier. (J. L.).

Pyrochroides.

♀ *Pyrochroa coccinea* L. — 1 ♀ sur une Ortie, Bois de Yernée, 18-V-37. (G. D.).

Lucanides.

♀ *Lucanus cervus* L. — AC à Beyne, Bellaire et Romsée, en VI et VII. (J. L.). A été C en divers endroits aux environs de Liège en 1937. Mes élèves m'en ont apporté de Liège, Bressoux, Sclessin, Ougrée, etc. (MA.). La var. *capreolus* FUESSL. est également AC à Amay en VI (G. D.).

Trox scaber L. — 2 exemplaires tombés à la lampe, chez moi, à Liège, 28-V-37 (MA.).

Scarabéides.

Aphodius ater DE G. — Beyne, 2-VIII-37. (J. L.).

A. porcus F. — Beyne, 30-IX-37. (J. L.).

♀ *Polyphylla fullo* L. — Réputé rare, il y a quelques années, se répand de nouveau au littoral. On nous en a rapporté plusieurs ♂ ♀ de Blankenberghe, Coxyde, Ostende, La Panne, en VI-VII et début de VIII-1937 et 38. (MA., J. L.).

Hoplia philanthus FUESSL. — Amay, fin VI-37. Vole à la soirée, comme beaucoup d'autres Scarabéides. (G. D.).

Silphides.

**Necrophorus investigator* ZETT. — Barse, 2-VIII-37, dans un cadavre de Hérisson (G. D.): 2 exemplaires, Wéris 10-VIII-37. (G. A.).

♀ *Necrodes littoralis* L. — 1 ♂ 1 ♀ Barse, 2-VIII-37, dans un cadavre de Lapin. (G. D.).

Scaphidium quadrimaculatum OL. — Comblain-au-Pont, 30-V-37.
(G. A.).

Carabides.

**Cychrus rostratus* L. — Hautes-Fagnes: Fontaine Périgny 25-VI-36, *Via Mansucrica* 18-VII-37. (D.).

**C. attenuatus* F. — Baraque-Michel, 18-VII-37. (D.)

**Licinus depressus* PAYK. — Wéris, 15-V-37. (G. A.).

Brachynus crepitans L. — 4 exemplaires Beyne, 6-V-37 (J. L.). — AC environs de Liège.

Dytiscides.

Hydroporus discretus FAIR. — Wéris, 15-V-37. (G. A.).

Agabus bipustulatus L. — un exemplaire de cette espèce C a été pris "à la lampe", chez moi, à Liège 28-V-37. (MA.).

HEMIPTERES

Pentatomides.

Picromerus bidens L. — Beyne 15-IX-37 (J. L.). AC région liégeoise.

***Brachypelta aterrima* FORST. — peut être nouveau pour notre faune (1); La Sarte (Huy), VII-1937. (P.).

Népides.

Ranatra linearis L. — Quelques exemplaires Wandre, "Vieille Meuse", en XI-37. (BH.).

Cercopides.

**Triecphora dorsata* GERM. — La Sarte (Huy), 21-VI-37. (P.).

Scarides.

Ledra aurita L. — Amay, 27-VII-37. (G. D.). — AC aux environs de Liège.

(1) L'absence de Catalogues belges récents pour les ordres des Hémiptères, Coléoptères, Diptères, etc., se fait de plus en plus sentir, et il serait hautement souhaitable que ces lacunes fussent comblées dans un prochain avenir.

DIPTÈRES

Tipulides.

Pedicia rivosa L. — 1 ♂ Lanaye VI-1937 (BH.). Espèce AC aux environs de Liège.

Tanyptera atrata L. — Une nymphe trouvée dans une souche pourrie de Sureau, au bois de Yernée; éclosion le 29-IV-37; 3 ♂ et 1 ♀ au même endroit, début de VI (G. D.). Espèce AC aux environs de Liège.

Asilides.

**Asilus crabroniformis* L. — Vivegnis VIII-1930 et Wandre I-IX-31 (BH.).

Stratiomyides.

Stratiomyia longicornis SCOP. — 2 ♀ de Loën, dont une d'élevage, V-VI-1935; 1 ♂ Lanaye 10-VIII-36 (MU.); 1 ♀ Beyne 13-VI-37 (J. L.). Espèce AC aux environs de Liège.

S. furcata F. — 1 ♀ sur *Chaerophyllum tremulum* L., Beyne 2-VII-37 (MA.). Cette localité s'ajoute à celles citées par A. COLLART ("Stratiom. de Belg.", 1933) pour montrer que l'espèce n'est pas spéciale au Littoral, comme l'écrivait LAMEERE ("Faune de Belg.", 1907).

Tabanides.

**Tabanus gigas* HERBST. — Bellaire 19-VI-36 (BH.).

Bombyliides.

**Lomatia lateralis* MG. — Quelques exemplaires Modave 25-VII-37 (MA.).

Empidides.

Empis maculata F. — 1 ♂ Herck-la-Ville, 10-V-36 (E.).

E. trigramma MG. — 1 ♂ Wéris 19-VII-36 (G. A.).

Syrphides.

- Syrphus grossulariae* MG. — Plusieurs ♀ Wéris 29-VII et 20-VIII-37 (G. A.).
**Volucella zonaria* PODA. — 1 ♀ Bellaire 8-VIII-37, 1 autre Moulins-sous-Fléron 17-VII-38 (J. L.); 1 ♂ Visé 28-VIII-38 (MU.). Espèce AR seulement aux environs de Liège.
Sericomyia borealis FALL. — 1 ♀ Wéris 29-VII-37 (G. A.). Espèce AC dans la province de Liège.
Arctophila mussitans F. — 1 ♂ Wéris 27-VIII-37 (G. A.). Même remarque.
Eristalis aeneus SCOP. — 2 exemplaires Modave 25-VII-37 (MA.). Même remarque.

Sciomyzides.

- ***Pelidnoptera nigripennis* F. — Peut-être nouvelle pour la faune belge; 2 ♂ 2 ♀ Lamorteau 31-V-36 (MA., det. A. COLLART).

HYMÉNOPTÈRES

Panphiliides.

- Acantholyda pinivora* ENSL. (= *stellata* CHRIST.). — 1 ♀ Lanaye 14-VI-34 (MU.).
**Cephaleia abietis* L. — 1 ♂ Hockai 25-V-31 (L.); 1 ♂ Tilff 12-V-29, 1 ♀ Mont-Rigi 18-VII-34 (MA.).
C. arvensis PANZ. (= *signata* F.) — 1 ♂ Engreux (Mabompré 5-VI-38 (MA.).
**Pamphilius depressus* SCHRK. — 1 ♀ Trooz 11-V-27 (MA.).
P. hortorum KL. — 1 ♀ Martinrive 21-V-32; 1 ♂ Engreux 5-VI, 1 ♀ Chaweresse (Méry) 22-V-37 (MA.).
**P. marginatus* LEP. — 1 ♂ Péry (Trooz) 19-V-16 (CA.), 1 ♀ Ile Monsin (Liège) 25-V-28 (L.), 1 ♂ Maredsous (Denée) 12-V-32 (Dom GUY de HENNIN).
P. silvaticus L. — 1 ♀ Herve 15-V (A. BODY), 2 ♀ Chaweresse (Méry) 22-V-37 (MA.). Parmi nos ♀, on trouve la var. *bimaculatus* ENSL. (avec 2 taches jaune pâle plus

ou moins étendues à l'extrémité du lobe médian du mésonotum), pouvant se combiner avec la var. *fumipennis* CURT. (1^{er} article des antennes entièrement jaune).

Siricides.

**Xiphydria camelus* L. — 1 ♀ Val-Dieu (Aubin-Neufchâteau) 8-VI-37 (BH.).

X. prolongata GEOFFR. — 1 ♀ Bellaire, 4 ♀ Beyne, 17 au 24-VII (J. L.); plusieurs ♀ Visé 23-VII-38 (MU.); AC aux environs de Liège.

***Xeris spectrum* L. — 1 ♀ Amonines VII-37 (BH.); 2^e localité signalée en Belgique!

Céphides.

Hartigia nigra HARR. — 1 ♀ Loën 26-V-31 (L.).

H. xanthostoma EVERS. (= *linearis* SCHRK.) — 1 ♀ Martinrive 19-VII-29, 1 autre Loën 21-VII-33; 1 ♂ Barvaux-sur-Ourthe 9-VI-34, 1 ♀ Comblain-au-Pont 9-VII-35 (MA.); 1 ♂ Lixhe 1-VII, 1 ♀ Bombaye 12-VI-34 (MU.). Espèce AR dans la région liégeoise. L'examen de ce matériel (et d'autre déjà renseigné précédemment) montre que cette espèce est synonyme de *linearis*. Les caractères qui leur sont respectivement attribués sont sujets à se mélanger, et il n'existe aucune limite précise entre les deux formes. M. H. BISCHOFF, le savant Conservateur du Musée de Berlin, est également de cet avis.

***Janus compressus* F., Belg. nov. sp. — 1 ♂ Liège V-1935 (CA.), 1 autre Comblain-la-Tour 29-V-35 (G. MAGNÉE). M. E. W. VAN DEN BRUEL avait déjà rapporté aux larves de cette espèce des dégâts sérieux causés aux Poiriers dans la région de Blégny-Trembleur (v. *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, 1935, p. 377).

J. femoratus CURT. — 2 ♀ Fraipont 25-V-36, 1 autre Chaweresse (Méry) 22-V-37 (MA.).

Cephus nigrinus THS. — 1 ♀ Comblain-la-Tour 28-V-32, 1 autre Wégimont (Soumagne) 4-V-33 (MA.).

C. pilosulus THS. — 1 ♀ Sy 24-VI-33 (M. GOETGHEBUER),
1 ♂ Eben 13-VI-36, et la ♀ AC Aywaille 19-VI-38
(MA.).

Tiphiidae.

Tiphia femorata F. — Est C certaines années sur les Ombelli-
fères, notamment à Sy et à Comblain-au-Pont; 1 ♂ de la
var. **Tournieri* D. T. Comblain-au-Pont 15-VIII-29 (MA.);
1 ♂ de la var. **villosa* SPIN. (prise autrefois à Uccle par
ED. DUBOIS) Loën 24-VIII-36 F. D.).

P. MARÉCHAL (Liège) et J. LECLERCQ (Beyne-Heusay).

Remarques sur la faune belge

(SUITE)

Confirmant les mentions précédentes quant à la présence d'*Eu-
prepia cribraria arenaria* LEMPKE au littoral, M. BIEBUYCK nous
signale qu'il y est même très abondant: "Le 21 juillet dernier,
à St.-Idesbald, j'aurais pu en capturer, au même endroit, en deux
heures de chasse à la lumière, plus d'une centaine, tant le
papillon était commun".

* * *

M. le Dr M. FONTAINE fait les remarques suivantes relatives
à la région de Charleroi: *Actinotia polyodon* CL., 2 ♀ ♀, Mar-
cinelle (miellée), les 31 mai et 4 juin derniers. *Bryophila divisa*
ESP., 1 ♂, Marcinelle, 8 août. Rappelons que cette espèce a
été découverte pour la première fois en Belgique par M. J. DRUET
en 1936 et qu'elle a été trouvée peu après à Namur, par M. le
Major VAN DER GUCHT. *Mania maura* L., 3 ♀ ♀ à la miellée,
2 à Marcinelle les 4 et 7 août et 1 à Loverval, le 19 août;
dans la région, on ne connaissait jusqu'ici que 2 captures: Dam-
premy (J. DRUET) et Marcinelle (R. BORN en 1934.)

(A continuer).

F. DERENNE.