

Note sur le *Xestobium plumbeum* ILLIG.

(COL. ANOBIIDAE)

PAR

JEAN LECLERCQ

Il a déjà été dit que cet Anobiide est assez commun aux environs de Beyne (Liège) où il creuse des galeries dans les vieux bois et les piquets de clôture (MARÉCHAL, 1937, citant mes observations). Depuis cette mention, j'ai rencontré chaque année *Xestobium plumbeum* à Beyne, Bellaire et Grivegnée, dans les vieux piquets de *Carpinus betulus* L., *Fagus sylvatica* L. et *Crataegus* sp. Les adultes sont déjà formés à l'intérieur du bois en janvier-février, leurs élytres sont alors d'un brun foncé. Ils sortent en mai pour circuler sur les arbres, leurs élytres sont alors généralement d'un noir bleuâtre.

En août 1944, j'ai trouvé à Liège plusieurs branches mortes de mûrier (*Morus alba* L.) creusées par les larves de cet Anobium. Quelques adultes sortirent en septembre, d'autres apparurent seulement au printemps 1945. Les *Xestobium* avaient été parasités ici par le

Xorides securicornis HOLMGREN

Ichneumonide de la sous famille des Pimplines dont une ♀ écloit en octobre 1944. Cette ♀, de petite taille, correspondait parfaitement à la description donnée par SCHMIEDEKNECHT (1907) et à celle publiée par CLÉMENT (1938) qui prouva la synonymie de cette espèce avec *Xorides clavicornis* KRIECHBAUMER. *Xorides securicornis* a été trouvé en plusieurs régions de l'Europe, notamment en Suède, en France et en Allemagne, on ne l'avait pas encore signalé de Belgique. On ne sait pas grand chose de ses mœurs sinon qu'il a été obtenu en France comme parasite du *Psoa italica* et en Suède comme parasite des *Pogonochaerus* vivant dans les Conifères.

AUTEURS CITÉS

CLÉMENT, E., 1938, *Opuscula Hymenopterologica VI.*, Festschrift für Prof. Dr Embrik Strand, 4, p. 536.

MARÉCHAL, P., 1937, *Insectes intéressants récoltés par le Cercle des Entomologistes Liégeois en 1936 ou antérieurement.* Lambillionea, 37, p. 232.

SCHMIEDEKNECHT, O., 1907, *Opuscula Ichneumonologica III*, fasc. 18, p. 1363.