



Répertoire des Hyménoptères Crabroniens de France

par Jean LECLERCQ (1)

Avec 77 espèces et sous-espèces, la tribu des Crabroniens (*Crabroninae Crabronini*) est la plus populeuse de la famille des Sphécides en France. Elle correspond à ce que Berland (1925) traitait comme « G. Grabro F. », dans un ouvrage qui eut ses mérites, mais qui est maintenant dépassé parce qu'on y appelle seulement 64 espèces et que la nomenclature a beaucoup changé.

Les tableaux et notes de De Beaumont (1964) permettent d'être beaucoup plus sûr des déterminations de matériel français, mais on n'y trouve que les 62 espèces de la Suisse, donc notamment pas une quinzaine d'espèces plus ou moins méditerranéennes. Comme cinq de celles-ci sont des *Lindenius*, on trouve un complément opportun dans la clé donnée pour ce genre, aussi par De Beaumont (1956). Mais pour le reste et en attendant mieux, il faut encore utiliser les tableaux de Kohl (1915) et se référer à la littérature rapportée dans ma Monographie (1954) et à trois descriptions plus récentes (Nouvel et Ribaut, 1956 ; Leclercq, 1972, 1974).

Ce n'est pas tout, la nomenclature maintenant usuelle en Europe ne pouvait se prétendre stabilisée définitivement parce que nous avons tous tardé à faire un sort à une série de noms introduits par les anciens taxonomistes, notamment Olivier (1792) et Lepeletier et Brullé (1834). J'ai moi-même négligé de m'en occuper parce que ce genre de travail est difficile, générateur de discussions oiseuses et parce que j'espérais encore en 1954, que le Code International de Nomenclature Zoologique, en instance de révision, deviendrait moins clémente pour les noms douteux du passé. Hélas, le nouveau Code adopté par le XVe Congrès International de Zoologie (Londres, 1958) et maintenant universellement appliqué, a maintenu à peu de réserves près, que « la priorité est le principe fondamental de la nomenclature zoologique ». Mieux valait donc en finir et je me suis astreint à rechercher (souvent vainement) les types méconnus, à analyser les anciennes descriptions (souvent très mauvaises) et à désigner des néotypes. Les résultats de cette enquête seront publiés ailleurs. J'en donne seulement ici, les conclusions en même temps qu'un répertoire à jour des espèces de la faune française. Le but poursuivi étant avant tout d'ordre pratique, je n'indique comme synonymes que les noms utilisés dans les ouvrages précités et j'ai marqué du signe * les espèces qui manquent dans De Beaumont (1964).

(1) Zoologie générale et Faunistique, Faculté des Sciences Agronomiques, 5800 Gembloux, Belgique.

Des localités ne sont données que pour les espèces jusqu'ici inconnues ou très douteuses de la faune française, mais je rappelle que le fichier de ma Faculté, à Gembloux, peut permettre, à tout moment, de réunir toutes les informations disponibles sur la répartition de chaque espèce, en France et ailleurs, et qu'il est dans mes intentions de les exploiter sous forme de cartes.

J'ai éliminé le *Crabro (Anotyhreus) lapponicus* Zetterstedt dont Berland (1925) disait « peut se trouver dans les Pyrénées françaises »; j'ai revu l'exemplaire cité de Catalogne (1895), c'est bien *lapponicus*, mais il reste le seul de provenance aussi méridionale.

**

Rhopalum Kirby

austriacum Kohl. — Var : Callian ♀ 1935 (Muséum de Paris); Grimaud ♀ 14-VIII-1963 (J.F. Aubert, I.N.R.A., Versailles).

clavipes (Linné)

coarctatum (Scopoli) (*tibialis* Fabricius)

nigrinum Kiesenwetter (*kiensenswetteri* Morawitz)

Lindenius Lepeletier et Brullé

albilabris (Fabricius)

ibericus ssp. *ibericus* Kohl *

ibericus ssp. *humilicollis* De Beaumont *

major De Beaumont *

melinopus Kohl *

mesopleuralis Morawitz *

panzeri (Vander Linden)

pygmaeus ssp. *pygmaeus* (Rossi) *

pygmaeus ssp. *armatus* (Vander Linden)

subaeneus Lepeletier et Brullé

thirionae Leclercq. — Description à l'impression. *

Entomognathus Dahlbom

brevis (Vander Linden)

dentifer Noskiewicz (*permixtus* Nouvel et Ribaut) *

Tracheliodes Morawitz

quinquenotatus (Jurine) *

Crossocerus Lepeletier et Brullé

Sous-genre *Hoplocrabro* Thomson

quadrimaculatus (Fabricius)

Sous-genre *Crossocerus* s. str.

denticrus Herrich-Schaeffer

distinguendus Morawitz

elongatulus (Vander Linden)

exiguus (Vander Linden)

ovalis Lepeletier et Brullé (*anxius* Wesmael)

palmipes (Linné) (*palmarius* Schreber)

pusillus Lepeletier et Brullé (*varus* Lepeletier et Brullé nec Panzer, *varius* Lepeletier)

tarsatus (Shuckard) (*palmipes* auct.)

wesmaeli (Vander Linden)

Sous-genre *Ablepharipus* Perkins

assimilis (Smith) (*tirolensis* Kohl)

congener Dahlbom

podagricus (Vander Linden)

Sous-genre *Oxycrabro* Leclercq

acanthophorus Kohl. — Var : Valescure 3 ♂♂ 28-VI-1970 (K.M. Guichard).

Sous-genre *Neoblepharipus* Leclercq

guichardi Leclercq. — Retrouvé par J.F. Aubert (I.N.R.A., Versailles), encore dans le Var : Pampelonne ♀ 2-VIII-1963 *

Sous-genre *Blepharipus* Lepeletier et Brullé (*Coelocrabo* Thomson)

annulipes Lepeletier et Brullé (*ambiguus* Dahlbom)

barbipes Dahlbom

capitosus (Shuckard)

cestratus (Shuckard)

cinxius (Dahlbom)

leucostoma (Linné) (*carbonarius* Dahlbom)

megacephalus (Rossi) (*leucostoma* auct.; *leucostoides* Richards)

nigritus Lepeletier et Brullé (*pubescens* Shuckard)

styrius Kohl

walkeri (Shuckard)

Sous-genre *Acanthocrabro* Perkins (*Blepharipus* auct.)

vagabundus (Panzer)

Sous-genre *Cuphocterus* Morawitz

binotatus Lepeletier et Brullé (*signatus* Panzer, *confusus* Schulz)

dimidiatus (Fabricius) (*serripes* Panzer)

Crabro Fabricius

alpinus Imhoff

cribrarius (Linné)

ingricus Morawitz. — Basses-Alpes : Le Fugeret, N. 208, carrière de sable, ♀ 8-VI-1966 (J. Leclercq, Gembloux).

loewi Dahlbom. — A rechercher en Bretagne. *

peltarius (Schreber)

peltatus Fabricius (*rhaeticus* Aichinger)

scutellatus (Scheven)

Ectemnius Dahlbom

Sous-genre *Cameronitus* Leclercq

nigritarsus (Herrich-Schaeffer)

Sous-genre *Hypocrabro* Perkins

confinis (Walker) (*laevigatus* Destefani)

continuus (Fabricius) ssp. *punctatus* (Lepeletier et Brullé) (*vagus* auct.)

hypsae (Destefani) *

meridionalis (Costa) (*impressus* Smith) *

rubicola (Dufour et Perris) (*larvatus* Wesmael)

Sous-genre *Thyreocerus* Costa

crassicornis (Spinola) *

massiliensis Kohl *

Sous-genre *Ectemnius* s. str.

borealis (Zetterstedt) (*nigrinus* Herrich-Schaeffer)

dives (Lepeletier et Brullé)

guttatus (Vander Linden) (*spinicollis* Herrich-Schaeffer)

rugifer Dahlbom. — Var : La Londe ♀ 29-VIII-1961; Bouches-du-Rhône : La Ciotat ♂ 22-VII-1963 (J.F. Aubert, I.N.R.A., Versailles).

Sous-genre *Clytochrysus* Morawitz

cavifrons (Thomson)

lapidarius (Panzer) *chrysostomus* Lepeletier et Brullé)

ruficornis (Zetterstedt) (*planifrons* Thomson, *nigrifrons* Cresson)

sexcinctus (Fabricius) (*zonatus* Panzer)

Sous-genre *Metacrabro* Ashmead
cephalotes (Olivier) (*quadricinctus* auct.)
fossorius (Linné)
kriechbaumeri (Kohl) *
lituratus (Panzer)
spinides (Morawitz)

Lestica Billberg

Sous-genre *Lestica* s. str.

alata (Panzer)
subterranea (Fabricius)

Sous-genre *Clypeocrabro* Richards

clypeata (Schreber)

Bibliographie

- BERLAND L., 1925. — Faune de France, 10 Hyménoptères Vespiformes, I. Paris, Lechevalier (et supplément, 1928, idem, 19, II, pp. 179-182).
- DE BEAUMONT J., 1956. — Notes sur les *Lindenius* paléarctiques (Hym. Sphecid.). *Mitt. Schweiz. Ent. Ges.*, 29, pp. 145-185.
- DE BEAUMONT J., 1964. — Hymenoptera: Sphecidae. *Insecta Helvetica Fauna*, 3, pp. 1-169.
- KOHL, F.F., 1915. — Die Crabronen der paläarktischen Region. *Ann. K.K. Naturhist. Hofmus. Wien*, 29, pp. 1-453.
- LECLERCQ J., 1954. — Monographie systématique, phylogénétique et zoogéographique des Hyménoptères Crabroniens. *Thèse d'Agrégation Fac. Sci. Univ. Liège*, pp. 1-371.
- LECLERCQ J., 1972. — *Grossocerus* (*Neoblepharipus*) *guichardi* n. sp., Crabronien trouvé en Provence. *Bull. Soc. Ent. Mulhouse*, 1972, pp. 7-10.
- LECLERCQ J., 1974. — Trois espèces nouvelles de *Lindenius* et quelques autres. *Bull. Rech. Agron. Gembloux*, sous presse.
- LEPELETIER A. et BRULLE A., 1834. — Monographie du genre *Crabro*, de la famille des Hyménoptères Fouisseurs. *Ann. Soc. Ent. France*, 4, pp. 683-810.
- OLIVIER A.G., 1792. — Encyclopédie méthodique, dictionnaire des Insectes. 6, article Frelon, *Crabro*, pp. 506-519.
- NOUVEL H. et RIBAUT H. — 1956. — Une espèce française nouvelle du genre *Entomognathus*. *Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse*, 91, pp. 263-265.