



Prise de position de la Société francophone du diabète (SFD) sur les stratégies d'utilisation des traitements anti-hyperglycémiantes dans le diabète de type 2 - 2021

Charles Thivolet (Président de la Société Francophone du Diabète (SFD))¹

Disponible sur internet le :
19 novembre 2021

Société Francophone du Diabète (SFD), Secrétariat Permanent, 60, rue Saint-Lazare,
75009 Paris, France

secretariat@sfd.org

Foreword. Strategies for use of antihyperglycemic treatments in type 2 diabetes: Position Statement of the Francophone Diabetes Society - 2021



La prise en charge médicamenteuse du diabète de type 2 (DT2) évolue, et il est nécessaire de mettre à jour la prise de position de la Société Francophone du Diabète (SFD) initiée en 2017 [1] et revue en 2019 [2]. La diversité des thérapeutiques permet de mettre en place une approche personnalisée dans une démarche de prise en charge globale tenant compte des effets bénéfiques de chaque classe sur le contrôle glycémique, le poids, le pronostic cardiovasculaire et rénal, mais aussi de leur profil de tolérance et de sécurité. Dans cette optique, les modifications du style de vie, l'éducation thérapeutique et l'implication du patient comme partenaire de sa prise en charge restent un socle incontournable du traitement du DT2. La SFD recommande toujours la metformine comme médicament de 1^{re} ligne et propose une stratégie graduée avec des approches de 2^o ligne ou de 3^o ligne intégrant les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT2), désormais disponibles en France, et les agonistes des récepteurs du glucagon-like peptide-1 (GLP-1), avec des indicateurs d'efficacité métabolique et d'amélioration du pronostic cardio-rénal. L'actualisation de la prise de position tient compte des dernières données des études cliniques. Le guide algorithmique des stratégies proposée dans cette prise de position sous une forme plus didactique est général. La décision clinique ultime est basée sur le cadre clinique, l'équilibre glycémique, les comorbidités, la tolérance des médicaments, leur prix, et les préférences du

¹ <http://www.sfdiabete.org>.

patient. Il s'avère nécessaire pour le clinicien de s'assurer que les stratégies concernées correspondent aux conditions de remboursement, qui peuvent varier en fonction des pays francophones. C'est donc dans le cadre d'une démarche coordonnée et réfléchie que la prise en charge devra s'effectuer, avec des évaluations successives pour définir les meilleures trajectoires de prise en charge.

Il s'agit d'un consensus d'experts fondé sur les preuves et l'expérience clinique, dont nous espérons qu'il aidera de façon pratique les cliniciens dans la prise en charge de cette maladie complexe.

Déclaration de liens d'intérêts : Charles Thivolet déclare avoir reçu des honoraires pour conseils, conférences, déplacements et/ou hébergements à but professionnel des entreprises Abbott, Janssen, Lilly, Medtronic, Roche Diabetes Care, Sanofi.

Références

- [1] Darmon P, Bauduceau B, Bordier L, et al. pour la Société Francophone du Diabète (SFD). Prise de position de la Société Francophone du Diabète (SFD) sur la prise en charge médicamenteuse de l'hyperglycémie du patient diabétique de type 2. *Med Mal Metab* 2017;11:577-93.
- [2] Darmon P, Bauduceau B, Bordier L, et al. pour la Société Francophone du Diabète (SFD). Prise de position de la Société Francophone du Diabète (SFD) sur la prise en charge médicamenteuse de l'hyperglycémie du patient diabétique de type 2-2019. *Med Mal Metab* 2019;13:711-32.