

*Epistrophe guttata* FALLEN, Overysse, 20-VIII-1949, 1 ♂, Crainhem, 27-VIII-1949, 1 ♂, Overmeire, 13-VIII-1944, 1 ♂, 1 ♀, Oostakker, 20-VI-1944, 1 ♀. Les collections de l'Institut renferment 3 spec. ♂♂ et 1 spec. ♀, provenant respectivement des collections COUCKE et JACOBS, capturés aux environs de Bruxelles vers la fin du siècle précédent. Les auteurs Allemands (SCHINER et SACK) considèrent cette espèce comme très rare. LUNDBECK mentionnait 6 captures pour le Danemark, toutes ♀♀. Elle est répandue dans toute l'Europe.

*Epistrophe triangulifera*, ZETTERSTEDT, Forêt de Soignes (Quatre Bras), 24-IV-1948, 1 ♂ sur châtons de Saule. La collection GUILLAUME renferme 1 ♀ (Boitsfort, 1904). LUNDBECK ne signalait que 3 captures pour le Danemark. SCHINER et SACK considèrent également l'espèce comme rare. Espèce nordique dont la dispersion est limitée à l'Europe centrale et septentrionale (SACK).

A. RYCKAERT.

**Un Crabronien (Hym. Sphegidae) nouveau pour la faune belge :**

***Rhopalum nigrinum* KIESENWETTER (= *Kiesenwetteri* MORAWITZ).**

Le D<sup>r</sup> Jean LECLERCQ a découvert cette espèce dans un lot d'Hyménoptères du genre *Crabro* que je lui avais envoyé pour examen, en vue d'un mémoire sur ce genre, qu'il prépare actuellement. L'espèce, m'écrit-il, a été capturée en Hollande, au Sud de l'Angleterre, en Rhénanie, en France méridionale et dans tous les pays de l'Europe centrale. C'est toutefois une espèce rare sur toute l'aire de sa répartition.

« Les *Rhopalum* sont généralement rubicoles : ils nidifient dans les tiges de Ronce, de groseillier, ou d'Althaea, mais aussi dans les trous creusés dans le bois par d'autres insectes. Leur nid se compose d'une suite de cellules où ils emmagasinent de petits Diptères, ou même des Psocides. » (L. BERLAND, Faune de France, Hyménoptères Vespiformes, I, p. 181.)

C'est en fauchant dans un marécage boisé à Berg, le 3-VII-1950 que j'ai capturé 2 spécimens de l'espèce.

A. RYCKAERT.

**Invasion massive d'une habitation par *Chloropisca notata* MEIGEN**

**(Dipt. Chloropidae).**

Le 4-XI-1950, le D<sup>r</sup> R. LEGROS, inspecteur d'Hygiène (Liège), nous a confié une quantité de mouchettes provenant du Couvent des

Chanoinesses à Jupille. Ces mouchettes ont envahi les pièces des premier, deuxième et troisième étages du couvent. Elles sont surtout apparues au cours des journées ensoleillées. Nous avons identifié ces mouchettes. Il s'agit de *Chloropsis notata* MEIGEN.

Suivant J. D'AGUILAR (*L'Entomologiste*, 1946, n<sup>os</sup> 1, 3-6), ces Micromuscides hivernent à l'état de pupes, cependant, dans certaines conditions, on assiste à des éclosions anormales. Les adultes paraissent présenter un instinct grégaire qui les pousse à s'abriter dans le même emplacement. C'est en automne que ces moucheron envahissent parfois par nuées certaines habitations.