

A propos du *Tabanus syriacus* Kröber (*Dipt. Tabanidae*) (*)

par Marcel LECLERCQ (**)

Grâce à l'amabilité du Dr. Fr. KÜHLHORN (Munich), nous avons eu l'occasion de vérifier le type et les paratypes de *Tabanus syriacus* KRÖBER (*Archif f. Naturgeschichte*, 1924-25, 90, p. 147).

Certaines contradictions ou lacunes nous étant apparues dans les mémoires de O. KRÖBER (1925, pp. 100 et 128 ; 1938, pp. 97 et 226) à propos de cette espèce, il nous a paru utile d'en présenter la description complète.

Elle fait partie du groupe de *Tabanus cordiger* MEIGEN dont les caractéristiques sont les suivantes : yeux nus, sans bande sur l'exemplaire vivant ou réhydraté ; callosité frontale basale et callosité frontale médiane séparées, sans aucune connexion distincte (parfois, elles peuvent paraître reliées sur certains exemplaires défraîchis, mais c'est par simple dénudation de la pruinosité) ; petites espèces.


Description de *Tabanus syriacus* KRÖBER

♀ : Tête : Yeux nus, verts sans bande après réhydratation. Bande frontale à bords pratiquement parallèles, à peine élargie au vertex, 4 fois aussi haute que large à la base ; callosité frontale basale brun pâle, n'atteignant pas les bords oculaires, rectangulaire, à bord supérieur irrégulier par dénudation de la pruinosité ; callosité frontale médiane séparée de la callosité basale, en forme d'U dont les branches latérales sont pointues et le trait basal, plus ou moins recouvert de pruinosité sur le type, est bien visible sur les trois paratypes, de coloration brunâtre clair sur le type et deux paratypes et brun noirâtre sur un paratype. La bande frontale est couverte de pruinosité gris blanchâtre avec pilosité jaunâtre ; quelques poils noirs au vertex. Bord postoculaire étroit à pilosité courte jaunâtre pâle. Triangle frontal mat, brun cannelle très clair. Face blanche à pilosité blanche. Antennes :

(*) Déposé à la rédaction le 11 avril 1961.

(**) Laboratoire de Zoologie générale, Institut agronomique de Gembloux.

articles 1 et 2 jaune brun pâle, article 1 avec quelques poils noirs au bord supérieur, poils blanchâtres au bord inférieur; article 3 rouge jaune clair avec un coin peu net à la base. Palpes : blanchâtres, article 1 gonflé à la base, pointu à l'extrémité, pilosité blanchâtre avec rares poils noirs à pointe.



Thorax : mat, gris noirâtre avec 5 bandes brun jaunâtre clair peu nettes; pilosité courte jaunâtre. Calus préalaire jaune brun avec poils noirs et blanchâtres. Pleures gris avec longue pilosité blanchâtre.

Pattes : Fémurs I brunâtres, tibias blanc jaunâtre à l'apex, 1/2 distale et tarses noir brunâtre. Pattes II et III jaune brun pâle.

Abdomen : jaune brun pâle à pilosité jaunâtre, latéralement pilosité noire peu marquée sur fond noirâtre, notamment sur les derniers tergites. Sternites jaune brun pâle, noirâtres sur les derniers, pilosité blanchâtre.

Ailes : claires à nervures jaune brun clair.

Longueur : corps (de la pointe des antennes à l'extrémité abdominale) 15-16 mm; aille 11-12 mm.

Type et 2 paratypes dans les collections du Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates, Munich, et un paratype dans nos collections; tous récoltés en Syrie.

♂ inconnu.

BIBLIOGRAPHIE

- KRÖBER, O. 1924-1925. Beiträge zur Kenntnis paläarktischer Tabaniden. (Teil III: Ochrops, Atylotus, Tabanus s. str., Baikalia, Isshikia). *Archiv. f. Naturgeschichte*, **90**, pp. 1-195.
- Id., 1925, Die Fliegen der Paläarktischen Region. **19**. TABANIDAE. *Stuttgart, Schweizerbart*, pp. 1-146.
- Id., 1938, Katalog der paläarktischen Tabaniden nebst Bestimmungstabellen und Zusätzen zu einzelnen Arten sowie Neubeschreibungen. *Acta Inst. Mus. Zool. Univ. Athen.*, **2**, pp. 57-245.