

Quelques *Hybomitra* END. (*Tylostypia* END.)
de Bouriatie, U.R.S.S. (*Dipt. Tabanidae*) (*)

par

Marcel LECLERCQ (**)

Grâce à l'amabilité de M. L. V. ZIMINA du Musée Zoologique de l'Université de Moscou, nous avons reçu pour étude 55 *Hybomitra* END., récoltés dans la partie sud de la Bouriatie (au sud du lac Baïkal), sur le versant sud de la chaîne Dzoun-Mourinsky, à Outata sur la rivière Tzakir, le 9 juillet 1961.

Il nous a paru utile de publier les résultats des récoltes de notre collègue, d'autant plus que cette région est particulièrement intéressante au point de vue zoogéographique pour la distribution des Tabanides.

Ce sont les espèces suivantes :

1. *Hybomitra angustipalpis* OLSOUFIEV : 2 ♀.

Répartition : Sakhaline, Nord de la Mongolie, Est de la Sibérie, Altai, Carélie.

2. *Hybomitra astur* ERICHS : 6 ♀.

Répartition : Sakhaline, Corée, Mandchourie, Qoussouri, Nord de la Mongolie, Transbaïkalie, Est de la Sibérie, Altai.

3. *Hybomitra borealis* ^{Meigen 1820 - borealis Loew 1858} ERICHS : 6 ♀.

Répartition : Sakhaline, Mandchourie, Mongolie, Sibérie, Parties de l'U.R.S.S., Carélie, Laponie, Finlande, Suède (jusqu'au sud de la Scanie), Danemark (Jutland), Pologne (Pomorza, Tatra), Bohème, Moravie, Autriche (Alpes de 800 à 2500 m), Suisse (rare, Bertoud), Haute Italie, Grèce (île de Tinos), Belgique (Hautes-Fagnes), France (Ardennes, Somme, Hautes Alpes, Haute Savoie, Hautes Pyrénées).

(*) Déposé à la rédaction le 14 mai 1962.

(**) Laboratoire de Zoologie générale, Institut agronomique de l'État, Gembloux.

4. *Hybomitra lundbecki* LYNEBORG : 9 ♀.

Répartition : Nord de la Mongolie, Oussouri, Mandchourie, Sibérie, Vladivostok, Kamtchatka, région du lac Baïkal, Kazakstan, U.R.S.S. (de la Carélie, Léninegrad à l'Ukraine), Finlande, Laponie, Suède, Danemark, Pologne, Bohême, Moravie, Slovaquie, Allemagne (Bavière, Nuremberg, Dachau, Ulm, Munich), Autriche, Slovaquie, Hongrie, Roumanie (région de Jassy), Italie septentrionale et méridionale, Suisse (butine *Heracleum sphondylium*), Belgique, France (Ardennes, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute Saône, Haute Savoie, Ariège).

mon taxon tuxeni Lynce.

5. *Hybomitra tropica* LINNE (~~*tuxeni* LYNEBORG~~) : 32 ♀.

Nous avons noté les variations suivantes dans la coloration du calus préalaire : entièrement brun rougeâtre chez 9 ♀.

base un peu noirâtre chez 2 ♀.

base et bords latéraux noirâtres chez 7 ♀.

presqu'entièrement noirâtre, seule une petite tache brun rougeâtre à l'extrémité chez 14 ♀.

Répartition : Japon (Yukomanbetsu, pied Monds, Taisetsuzan, 2 ♀, 8.VII. 1960), Bouriatie, Danemark, Tchécoslovaquie, Autriche (Starnberg), France (Jura).

BIBLIOGRAPHIE

LECLERCQ, M. Révision systématique et biogéographique des Tabanidae. (Diptera) paléarctiques, vol. II, TABANINAE. *Mém. Inst. roy. Sci. nat Belg.*, en préparation.