

Tabanidae (Diptera) de Turquie, III (*)

par

Marcel LECLERCQ (**)

Ce travail constitue notre cinquième contribution à l'étude des Diptères suceurs de sang de Turquie (LECLERCQ, 1966a, 1966b, 1967a, 1967b). Il concerne les Tabanides récoltés au cours de notre expédition, juillet-août 1967, dans les provinces suivantes : *Edirne, Istanbul, Adapazarı, Bolu, Ankara, Çorum, Samsun, Afyon, Denizli, Izmir, Aydın, Balıkesir, Bursa*.

Le présent document donne le relevé des 24 espèces et 6 variétés récoltées ; parmi celles-ci, *Atylotus fulvus*, *Tabanus vappa* et *Haematopota pallens* sont signalées pour la première fois de Turquie, ce qui porte à 104 espèces et 18 variétés (avec *Tabanus spodopterus ponticus*) la faune des Tabanides, remarquable par sa richesse et sa variété (LECLERCQ, 1967a).

Inventaire des espèces

1. *Chrysops* (s. str.) *caecutiens* L.

Bolu : Gerede ♀ 9.VII.1967 ; Afyon ♀ 13.VII.1967.

2. *Chrysops* (s. str.) *pictus* MEIGEN.

Afyon ♀ 13.VII.1967 ; Bolu : Lac Abant 1512 m 9 ♀ 26.VII.1966, 54 ♀ 28.VII.1966. Cette espèce européenne a son aire de distribution limitée à l'est par le Caucase (LECLERCQ, 1960 carte 14).

3. *Chrysops* (*Heterochrysops*) *flavipes punctifer* LOEW.

Bolu : Gerede 3 ♀ 9.VII.1967 ; Afyon 2 ♀ 13.VII.1967 ; Denizli : Pamukkale ♂ ♀ 15.VII.1967, Denizli ♀ 16.VII.1967.

4. *Chrysops* (*Pseudochrysops*) *hamatus* LOEW.

Denizli : Pamukkale ♀ 15.VIII.1967.

(*) Déposé à la rédaction le 7 septembre 1967.

(**) Laboratoire de Zoologie générale (Prof. Jean LECLERCQ), Faculté des Sciences agronomiques de l'État, Gembloux.

5. *Dasyrhamphus umbrinus* MEIGEN.
Bolu : Gerede 2 ♀ 8.VII.1967 ; Samsun : Kavak ♀ 10.VII.1967 ; Çorum : Bogazkale ♀ 12.VII.1967.
6. *Hybomitra decora defasciata* SZILADY.
Bolu : Gerede ♀ 8.VII.1967.
7. *Hybomitra schineri* LYNEBORG.
Balikesir : Erdek ♀ 26.VII.1967, Bandirma-Erdek ♀ 25.VII.1967 ; Afyon ♀ 13.VII.1967.
8. *Atylotus fulvus* MEIGEN.
Bursa : Bursa-Uludag 1000 m ♀ 27.VII.1967 ; Afyon 2 ♀ 13.VII.1967.
Cette espèce, inconnue en Turquie, existe aux altitudes moyennes et plus ou moins élevées de l'Eurasie et au Maroc (LECLERCQ, 1967c, carte 37) ; elle me paraît plus fréquente en dehors de la zone méditerranéenne.
9. *Atylotus hendruxi* LECLERCQ.
Afyon 28 ♀ 13.VII.1967.
10. *Tabanus autumnalis autumnalis* L.
Istanbul : Kumburgaz ♂ 5.VII.1967 ; Afyon 5 ♀ 13.VII.1967.
- 10b. *Tabanus autumnalis brunescens* SZILADY.
Izmir : Efes ♂ 18.VII.1967 ; Aydin : Argavli ♀ 19.VII.1967 ; Afyon ♀ 13.VII.1967.
11. *Tabanus bifarius* LOEW.
Bolu : Akçakoca ♀ 7.VII.1967 ; Çorum 6 ♀ 10.VII.1967 ; Afyon : Bayat ♀ 13.VII.1967.
12. *Tabanus bromius bromius* L.
Edirne ♀ 5.VII.1967 ; Bolu : Gerede ♀ 9.VII.1967 ; Samsun ♀ 11.VII.1967 ; Ankara : Delice 6 ♀ 12.VII.1967 ; Afyon : Bayat 3 ♀ 13.VII.1967, Afyon ♂ 28 ♀ 13.VII.1967 ; Denizli : Pamukkale ♀ 16.VII.1967, Camlik ♀ 16.VII.1967 ; Izmir : Efes 6 ♀ 18.VII.1967, Kusadasi ♂ 20.VII.1967 ; Aydin : Argavli ♀ 19.VII.1967, Ortaklar 3 ♀ 19.VII.1967 ; Balikesir : Bigadic 6 ♀ 23.VII.1967, Erdek ♀ 24.VII.1967, ♀ 25.VII.1967.
13. *Tabanus darimonti* LECLERCQ.
Izmir : Efes 2 ♀ 18.VII.1967 dont 1 ♀ comme proie d'un Asilide, Kusadasi ♀ 21.VII.1967.
14. *Tabanus eggeri prometheus* SZILADY.
Bursa : Bursa-Uludag 800 m ♀ 27.VII.1967, Gorükle ♀ 27.VII.1967 ; Balikesir : Bandirma-Erdek 8 ♀ 25.VII.1967 ; Afyon 2 ♂ ♀ 13.VII.1967.
15. *Tabanus exclusus* PANDELLE.
Bursa : Kurlu ♀ 28.VII.1967 ; Denizli : Camlik 5 ♀ 16.VII.1967.
16. *Tabanus graecus apricus* MEIGEN.
Bursa : Bursa-Uludag 1000 m 3 ♀ 27.VII.1967, 1500 m 3 ♀ 27.VII.1967.

17. *Tabanus miki miki* BRAUER.
Afyon 7 ♀ 13.VII.1967.
18. *Tabanus mixtus* SZILADY.
Denizli : Camlik 7 ♂ 2 ♀ 16.VII.1967.
19. *Tabanus quatuornotatus* MEIGEN.
Çorum ♀ 10.VII.1967.
20. *Tabanus regularis regularis* JAENNICKE.
Denizli : Pamukkale 2 ♀ 14.VII.1967, Camlik ♀ 16.VII.1967 ; Balikesir : Erdek 3 ♀ 26.VII.1967 ; Izmir : Kusadasi ♀ 21.VII.1967.
21. *Tabanus spectabilis* LOEW.
Çorum : Bogazkale ♀ 12.VII.1967 ; Ankara : Delice ♀ 12.VII.1967.
22. *Tabanus spodopterus ponticus* OLSUFJEV, MOUCHA et CHVALA.
Bursa : Gorükle 4 ♀ 27.VII.1967, Kulru 4 ♀ 28.VII.1967 ; Balikesir : Bandirma-Erdek 26 ♀ 25.VII.1967, Erdek ♀ 25.VII.1967. Cette variété, a été décrite de Bulgarie et de Turquie (Ankara : Baraj) (OLSUFJEV, MOUCHA et CHVALA, 1967).
23. *Tabanus unifasciatus* LOEW.
Çorum : Bogazkale ♀ 12.VII.1967.
24. *Tabanus vappa* BOGATSHEV et SAMEDOV.
Denizli : Pamukkale 2 ♀ 14.VII.1967, Camlik 4 ♀ 16.VII.1967. Cette espèce, inconnue de Turquie, était seulement signalée d'U.R.S.S. (Azerbaïdjan, Nakhitchevan) (LECLERCQ, 1967, carte 52).
25. *Haematopota belligera* AUSTEN.
Denizli ♀ 16.VII.1967.
26. *Haematopota coolsi* LECLERCQ.
Izmir : Kusadasi ♀ 20.VII.1967, Efes ♀ 18.VII.1967 ; Balikesir : Erdek ♀ 26.VII.1967.
- 26b. *Haematopota hennauxi* LECLERCQ.
Bolu : Gerede 2 ♀ 8.VII.1967 ; Afyon ♀ 13.VII.1967 ; Çorum : Bogazkale ♀ 12.VII.1967.
Cette espèce était seulement connue des provinces d'Afyon et d'Eskisehir (LECLERCQ, 1967a).
27. *Haematopota kemali* AUSTEN.
Ankara : Delice 2 ♀ 12.VII.1967 ; Denizli ♀ 16.VII.1967 ; Afyon : Dinar ♀ 13.VII.1967, Afyon 3 ♀ 13.VII.1967.
28. *Haematopota pallens* LOEW.
Izmir : Efes ♀ 18.VII.1967.
Cette espèce, inconnue en Turquie, est distribuée en U.R.S.S. (Sud de l'Ukraine, Crimée, Caucase, Daghestan, Arménie, Azerbaïdjan, Nakhitchevan, Kazakstan, Turkestan), Iran (Fars, Baluchistan, Kerman), Iraq (Euphrate) (LECLERCQ, 1967c, carte 82).

Cette espèce, inconnue en Turquie, est distribuée en U.R.S.S. (Sud de l'Ukraine, Crimée, Caucase, Daghestan, Arménie, Azerbaïdjan, Nakhitchevan, Kazakstan, Turkestan), Iran (Fars, Baluchistan, Kerman), Iraq (Euphrate) (LECLERCQ, 1967c, carte 82).

Remarques

Le détail du matériel récolté au cours de notre mission en juillet-août 1967 s'établit comme suit :

<i>Chrysops</i>	3 espèces, 1 variété	1♂	8♀	9 exemplaires
<i>Dasyrhamphis</i>	1 espèce		4♀	4 exemplaires
<i>Hybomitra</i>	1 espèce, 1 variété		4♀	4 exemplaires
<i>Atylotus</i>	2 espèces		31♀	31 exemplaires
<i>Tabanus</i>	12 espèces, 4 variétés	13♂	138♀	151 exemplaires
<i>Haematopota</i>	5 espèces		16♀	16 exemplaires
	24 espèces, 6 variétés	14♂	201♀	215 exemplaires

BIBLIOGRAPHIE

- LECLERCQ, M. 1960. Révision systématique et biogéographique des Tabanides (Diptera) paléarctiques I. PANGONIINAE et CHRYSOPINAE. *Mém. Inst. roy. Sci. nat. Belg.*, 2^e série, **63**, 1-77, X pls, 26 cartes.
- LECLERCQ, M. 1966a. Contribution à l'étude des Diptères suceurs de sang de Turquie (CULICIDAE, CERATOPOGONIDAE, MUSCIDAE, HIPPOBOSCIDAE). *Bull. Rech. agron. Gembloux*, N.S. **1**, 455-457.
- LECLERCQ, M. 1966b. Tabanidae (Diptera) de Turquie Diagnoses d'*Atylotus hendrixi*, *Haematopota coolsi*, *Haematopota delozi* n. spp. *Ibidem*, N.S. **1**, 463-477.
- LECLERCQ, M. 1967a. Tabanidae (Diptera) de Turquie II, Diagnoses d'*Hybomitra okayi*, *Atylotus hendrixi*, *Haematopota hennauxi* n. spp. *Ibidem*, N.S. **2**, 106-127.
- LECLERCQ, M. 1967b. Contribution à l'étude des Diptères suceurs de sang de Turquie Présence de *Musca (Philaematomyia) crassirostris* STEIN (Diptera Muscidae). *Ibidem*, N.S. **2**, (sous-*presse*).
- LECLERCQ, M. 1967c. Révision systématique et biogéographique des Tabanidae (Diptera) paléarctiques II. TABANINAE. *Mém. Inst. roy. Sci. nat. Belg.*, 2^e série, 1966, **80**, 1-236, XIX pls, 90 cartes.
- OLSUFJEV, N. F., MOUCHA, J. et CHVALA, M. 1967. Zur Taxonomie und Verbreitung der europäischen und kleinasiatischen Arten der *Tabanus bovinus*-Gruppe. *Acta ent. Bohemoslovaca*, **64**, 303-313.