

Tabanidae (Diptera) des Balkans

par

Marcel LECLERCQ ¹⁾

Grâce à l'amabilité de M. Drs. V. S. VAN DER GOOT, nous avons eu la possibilité d'étudier une série de Tabanides récoltés principalement en Grèce et en Yougoslavie et certains en Italie. Ce matériel provient des collections du Zoölogisch Museum der Universiteit, Amsterdam.

Cette note nous permet d'apporter une nouvelle contribution à la connaissance de la faune des Tabanides des Balkans (LECLERCQ, 1958, 1959, 1961, 1965).

¹⁾ Laboratoire de Zoologie générale (Prof. Jean LECLERCQ), Faculté des Sciences agronomiques, Gembloux, Belgique.

INVENTAIRE

1. *Pangonius (s. str.) fulvipes* Loew
Samos: Vathy, ♂, 15.V.1963.
2. *Silvius vituli* Fabricius
Slovénie: Medno, 12 km NNO²⁾ de Ljubljana, 2 ♀, 18.VII.1965.
Macédoine: col de Mukos, 12 km NE de Prilep, 1000—1100 m, ♀, 24.VII.1965.
3. *Chrysops (s. str.) caecutiens* L.
Italie: Prov. Gorizia, 3 km SO de Monfalcone, ♀, 7.VII.1966.
- 3bis. *Chrysops (s. str.) caecutiens ludens* Strobl
Macédoine: Lekhovon, 10 km NNE de Vlachoklisura, ♀, 22.VIII.1965.
4. *Chrysops (Heterochrysops) italicus* Meigen
Serbie: Zahač, 9 km E de Peč, ♀, 15.VIII.1965. Macédoine: 18 km SE de Ohrid, ♂, 2.VIII.1965; 5 km S de Bogazikon, ♂, 20.VIII.1965. Thessalie: Lechonia, 15 km SO de Volos, 6 ♂, 11 ♀, 7-11.VIII.1965.
5. *Dasyrbamphibis ater* Rossi
Istrie: 5 km NO de Podgorje, 600 m, ♀, 1.VII.1966.
6. *Atylotus loewianus* Villeneuve
Istrie: 5 km NO de Podgorje, 600 m, 11.VII.1966; Lanišče, 700—800 m, 2 ♀, 23.VII.1966; 2 km SE de Buje, ♀, 10.VII.1966. Serbie: Reka, 10 km NO de Kačanik, ♂, 7.VIII.1965; 6 km O de Kačanik, 1100 m, ♀, 4.VIII.1965. Macédoine: col de Mukos, 12 km NE de Prilep, 1000—1100 m, ♀, 24.VII.1965.
7. *Tabanus autumnalis* L.
Macédoine: Kruje, 15 km ENE de Ohrid, 1000 m, ♀, 2.VIII.1965. Thessalie: Lechonia, 15 km SO de Volos, ♂, 7-11.VIII.1966.
8. *Tabanus bifarius* Loew
Istrie: 12 km S de Izola, ♀, 8.VII.1966.
9. *Tabanus bromius* L.
Slovénie: Medno, 12 km NNO de Ljubljana, 8 ♀, 18.VII.1965. Istrie: 2 km SE de Buje, 2 ♀, 10.VII.1966. Croatie: Novska, 20 ♀, 19.VII.1965. Serbie: Predjane, 20 km SSE à E de Leskovac, 6 ♀, 20.VII.1965; Brezovica, 22 km E de Prizren, ♀, 10—12.VIII.1965; Reka, 10 km NO de Kačanik, ♂ ♀, 7.VIII.1965. Macédoine: Titov Veles, ♀, 23.VII.1965; Štip, 2 ♀, 23.VII.1965; col de Mukos, 12 km NE de Prilep, 1000—1100 m, ♀, 24.VII.1965; Krusje, 15 km ENE de Ohrid, 1000 m, ♀, 2.VIII.1965.
10. *Tabanus exclusus* Pandellé
Serbie: Reka, 10 km NO de Kačanik, ♀, 7.VIII.1965. Macédoine: Izvor, 17 km SSO de Titov Veles, ♀, 22.VII.1965; col de Mukos, 21 km NE de Prilep, 1000—1100 m, ♀, 24.VII.1965. Olympos: Spilios Agapitos, 2100 m, 11 ♀, 28.VII-5.VIII.1965; Olympos, O de Litochoron, 1450 m, ♀, 31.VII.1965, 1750 m, 6 ♀, 2.VIII.1965.
11. *Tabanus glaucopsis* Meigen
Serbie: 21 km E de Prizren, 1300 m, ♀, 11.VIII.1965; Radavac, 8 km N

²⁾ N = nord, E = est, S = sud, O = ouest.

- de Peč, ♀, 16.VIII.1965. Macédoine: Popova Šapka, 10 km OSO de Tetovo, 1800—2000 m, ♀, 6-8.VIII.1965. Olympos: Spilios Agapitos, 2100 m, 16 ♀, 28.VII-5.VIII.1965; Olympos, O de Litochoron, 1750 m, 2 ♀, 2.VIII.1965, 1450 m, 31.VII.1965. Thessalie: Lechonia, 15 km SO de Volos, ♂, 7-11.VIII.1965.
12. *Tabanus graecus graecus* Fabricius
Istrie: 2 km ESE de Valtura, ♂, 14.VII.1966; 2 km N de Kanfanar, 23 ♀, 16.VII.1966. Macédoine: Krusje, 15 km ENE de Ohrid, 1000 m, ♀, 2.VIII.1965. Olympos: Spilios Agapitos, 2100 m, ♂, 28.VII-5.VIII.1965.
- 12bis. *Tabanus graecus apricus* Meigen
Istrie: 15 km NO de Opatija, 850—950 m, ♀, 21.VII.1966. Macédoine: Pelister, versant Sud, 18 km O de Bitola, 1800—2000 m, 7 ♀, 31.VII.1965.
13. *Tabanus mixtus* Szilady
Macédoine: Izvor, 17 km SSO de Titov Veles, 3 ♀, 23.VII.1965.
14. *Tabanus regularis* Jeannicke
Macédoine: Krusje, 15 km ENE de Ohrid, 1000 m, ♀, 2.VIII.1965.
15. *Tabanus spectabilis* Loew
Macédoine: Štip, ♂, 29.VII.1965.
16. *Tabanus sudeticus* Zeller
Croatie: Novska, 12 ♀, 19.VII.1965.
17. *Tabanus tergestinus* Egger
Istrie: 2 km N de Kanfanar, 9 ♀, 16.VII.1966; 5 km NO de Podgorje, 600 m, 4 ♀, 11.VII.1966; 2 km SE de Buje, 3 ♀, 10.VII.1966; Mumjan, 6 km NE de Buje, 2 ♀, 9.VII.1966; 4 km NO de Vizinada, val Mirna, ♀, 12.VII.1966; 2 km ESE de Valtura, ♀, 14.VII.1966; 2 km S de Izola, ♀, 8.VII.1966. Serbie: Predejane, 20 km SSE à E de Leskovac, 2 ♀, 20.VII.1965.
18. *Tabanus tinctus* Walker (*eggeri* Schiner)
Istrie: 5 km NO de Podgorje, 600 m, ♀, 11.VIII.1966. Macédoine: Izvor, 17 km SSO de Titov Veles, ♀, 22.VII.1965.
19. *Tabanus unifasciatus* Loew
Macédoine: Otavica, 10 km N de Titov Veles, ♀, 28.VII.1965.
20. *Haematopoda pluvialis pluvialis* L.
Serbie: 20 km E de Prizren, 1650—2050 m, ♀, 13.VIII.1965. Macédoine: Popova Šapka, 10 km OSO de Tetovo, 1800—2000 m, ♀, 6-8.VIII.1965.

Bibliographie

- LECLERCQ, M., 1958, Mission E. JANSSENS en Grèce, 1957, 2^o note: Diptera: Tabanidae. *Bull. Ann. Soc. roy. Ent. Belg.* 94: 75—78.
- , 1959, Tabanidae (Diptera) de Yougoslavie, Récoltes de Macédoine *Therio-plectes simovae* n. sp. *Fragmenta Balcanica*, 2: 131—184.
- , 1961, Tabanidae (Diptera) de Yougoslavie, II. *Ibidem*, 3: 183—188.
- , 1965, Tabanidae (Diptera) des Balkans et de Sicile. *Bull. Inst. agron. Sta. Rech. Gembloux*, 33: 132—134.