

TABANIDAE (DIPTERA) DE ESPAÑA
Y PORTUGAL

POR

MARCEL LECLERCQ

Publicado en «GRAELLSIA», REVISTA DE ENTOMÓLOGOS IBÉRICOS
(Tomo XXXIV, 1978, págs. 53 - 57)

28 de marzo de 1980

INSTITUTO ESPAÑOL DE ENTOMOLOGÍA
MADRID

TABANIDAE (DIPTERA) DE ESPAÑA Y PORTUGAL

POR

MARCEL LECLERCQ

Este trabajo constituye la contribución XVII al estudio de los *Tabanidae* de España (LECLERCQ, 1977) y la contribución II en lo que se refiere al conocimiento de las especies de Portugal (LECLERCQ, 1964). Las localidades que menciono corresponden a las provincias españolas de Ávila, Cáceres, Navarra, Segovia y Soria, así como a la de Algarve, en Portugal.

La nomenclatura de las especies es la misma de nuestro catálogo de los *Tabanidae* paleárticos (LECLERCQ y OLSUFJEV, 1975). Respecto a *Pangonius hermanni* KRÖBER ♂, aquí mencionado, fue descrito en otra ocasión (LECLERCQ, 1974).

RELACIÓN DE ESPECIES.

1. *Atylotus fulvus rufipes* (MEIG., 1820).

Tabanus fulvus rufipes MEIGEN, 1820. *Syst. Besch.*, 2: 59.

Ávila: El Barco de Ávila, alt. 1.126 m., 3 ♀♀, 12-VII-1973. Segovia: Riaza, 1.200 m., 1 ♀, 11-VII-1973. Soria: Almarza, 1.056 m., 1 ♀, 10-VII-1973.

2. *Atylotus quadrifarius* (LOEW, 1874).

Tabanus quadrifarius LOEW, 1874. *Zeitschr. Ges. Naturw. N. F.*, 9: 414.

Atylotus agrestis auct., nec WIEDEMANN, 1828. CHVALA, LYNEBORG, MOUCHA, 1972. The Horse Flies of Europe (*Diptera: Tabanidae*). *Ent. Soc. Copenhagen*, pág. 276.

Algarve: Aldeia das Acoteias, 25 m., 3 ♀♀, 19-VII-1973; Silves, 120 m., 1 ♀, 20-VII-1973.

3. *Chrysops caecutiens ludens* LOEW, 1858.

Chrysops ludens LOEW, 1858. *Verh. Zool.-bot. Ges., Wien*, 8: 628.

Navarra: Espinal, Roncesvalles, 850 m., 1 ♀, 9-VII-1973. Soria: Almarza, 1.056 m., 1 ♀, 10-VII-1973; Garray, 1.056 m., 7 ♀♀, 10-VII-1973.

4. **Chrysops (Heterochrysops) flavipes punctifer** LOEW, 1856.

Chrysops punctifer LOEW, 1856. *Neue Beitr. Kenntn. Dipt.*, 4: 24.

Soria: Garray, 1.056 m., 1 ♀, 10-VII-1973.

5. **Haematopota csikii** SZILADY, 1922.

Haematopota csikii SZILADY, 1922. *Kalkan-Kutat. Tud. Eredm.*, 1: 68.

Haematopota perisi SALOM, 1961. *Bol. R. Soc. esp. Hist. Nat. (B.)*, 59: 102.

Soria: Garray, 1.056 m., 2 ♀ ♀, 10-VII-1973.

6. **Haematopota ocelligera** (KRÖBER, 1922).

Chrysozona bigoti ocelligera KRÖBER, 1922. *Arch. Naturgesch. (A)*, 88: 161.

Haematopota pluvialis var. *hispanica* SZILADY, 1923. *Biologica Hung.*, 1: 38.

Haematopota belligera AUSTEN, 1925. *Bull. ent. Res.*, 16: 13.

Segovia: Riaza, 1.200 m., 1 ♀, 11-VII-1973. Soria: Garray, 1.056 m., 27 ♀ ♀, 10-VII-1973.

7. **Haematopota pluvialis** (L., 1758).

Tabanus pluvialis LINNÉ, 1758. *Syst. Nat.*, ed. X, 602.

Ávila: El Barco de Ávila, 1.126 m., 1 ♀, 12-VII-1973. Navarra: Espinal, Roncesvalles, 850 m., 7 ♀ ♀, 9-VII-1973.

8. **Hybomitra distinguenda** (VERRALL, 1909).

Tabanus distinguendus VERRALL, 1909. *Brit. Flies*, 5: 371.

Ávila: El Barco de Ávila, 1.126 m., 1 ♀, 12-VII-1973.

9. **Philipomyia aprica** (MEIG., 1820).

Tabanus apricus MEIGEN, 1820. *Syst. Besch.*, 2: 37.

Soria: Almarza, 1.056 m., 1 ♀, 10-VII-1973.

10. *Pangonius hermanni* KRÖBER, 1921.

Pangonia hermanni KRÖBER, 1921. *Arch. f. Naturg. (A)*, **82**: 37.

Pangonia hannibal SZILADY, 1923. *Biologica Hung.*, **1**: 26.

Segovia: Riaza, 1.200 m., 1 ♂ y 1 ♀, 11-VII-1973.

El alotipo ♂ ha sido descrito en un trabajo anterior (LECLERCQ, 1974); la ♀ que menciono fue capturada mientras volaba junto a los miembros inferiores de una mujer, sin que hubiera habido tiempo de comprobar que podía succionar la sangre. Puede relacionarse este comportamiento con el de los *Pangonius micans* MEIGEN que observamos en Poyatos, en la provincia de Cuenca (LECLERCQ, 1971).

11. *Pangonius micans* MEIG., 1820.

Pangonia micans MEIGEN, 1820. *Syst. Besch.*, **2**: 25.

Soria: Garray, 1.056 m., 1 ♀, 10-VII-1973.

12. *Tabanus autumnalis* L., 1761.

Tabanus autumnalis LINNÉ, 1761. *Fauna Succ.*, pág. 462.

Cáceres: Villanua, 430 m., 1 ♀, 28-VII-1973. Segovia: Riaza, 1.200 m., 1 ♀, 11-VII-1973. Soria: Almarza, 1.056 m., 1 ♀, 10-VII-1973; Garray, 1.056 m., 1 ♀, 10-VII-1973.

Algarve: Silves, 120 m., 2 ♀ ♀, 20-VII-1973.

13. *Tabanus bromius* L., 1758.

Tabanus bromius LINNÉ, 1758. *Syst. Nat.*, X edic., 602.

Ávila: El Barco de Ávila, 1.126 m., 10 ♀ ♀, 12-VII-1973. Cáceres: Cáceres, 439 m., 2 ♀ ♀, 28-VII-1973. Soria: Almarza, 1.056 m., 16 ♀ ♀, 10-VII-1973; Garray, 1.056 m., 10 ♀ ♀, 10-VII-1973.

Algarve: Aldeia das Acoteias, 25 m., 1 ♀, 19-VII-1973; Silves, 120 m., 1 ♀, 20-VII-1973.

14. *Tabanus bromius flavofemoratus* STROBL, 1909.

Tabanus bromius flavofemoratus STROBL, 1909. *Verh. Zool.-bot. Ges., Wien*, 59: 292.

Cáceres: Villanua, 430 m., 1 ♀, 28-VII-1973.

Algarve: Aldeia das Acoteias, 25 m., 2 ♀ ♀, 19-VII-1973.

15. *Tabanus cordiger* MEIG., 1820.

Tabanus cordiger MEIGEN, 1820. *Syst. Besch.*, 2: 47.

Segovia: Riaza, 1.200 m., 10 ♀ ♀, 11-VII-1973. Soria: Almarza, 1.056 m., 4 ♀ ♀, 10-VII-1973; Garray, 1.056 m., 19 ♀ ♀, 10-VII-1973.

Algarve: Baragem de Arade, 400 m., 1 ♀, 22-VII-1973.

16. *Tabanus eggeri* SCHIN., 1868.

Tabanus tinctus auct., nec WALKER, 1850. CHVALA, LYNEBORG, MOUCHA, 1972. *The Horse Flies of Europe (Diptera: Tabanidae)*. *Ent. Soc. Copenhagen*, pág. 392.

Tabanus intermedius EGGER, 1859. *Verh. Zool.-bôt. Ges., Wien*, 9: 389 (nec WALKER, 1848).

Tabanus eggeri SCHINER, 1868. *Novara Reise, Dipt.*, pág. 81.

Cáceres: Cáceres, 439 m., 5 ♀ ♀, 28-VII-1973. Segovia: Riaza, 1.200 m., 2 ♀ ♀, 11-VII-1973.

Algarve: Caldas de Monchique, 600 m., 1 ♂ y 1 ♀, 20-VII-1973.

17. *Tabanus lunatus* FABR., 1794.

Tabanus lunatus FABRICIUS, 1794. *Ent. Syst.*, 4: 370.

Algarve: Aldeia das Acoteias, 25 m., 2 ♀ ♀, 19-VII-1973.

18. *Tabanus nemoralis* MEIG., 1820.

Tabanus nemoralis MEIGEN, 1820. *Syst. Besch.*, 2: 50.

Ávila: El Barco de Ávila, 1.126 m., 1 ♂ y 16 ♀ ♀, 12-VII-1973. Segovia: Riaza, 1.200 m., 9 ♀ ♀, 11-VII-1973. Soria: Almarza, 1.056 m., 2 ♀ ♀, 10-VII-1973; Garray, 1.056 m., 8 ♀ ♀, 10-VII-1973.

19. *Tabanus rectus* LOEW, 1858.

Tabanus rectus LOEW, 1858. *Verh. Zool.-bot. Ges., Wien*, 8: 603.

Soria: Garray, 1.056 m., 1 ♀, 10-VII-1973.

Algarve: Caldas de Monchique, 600 m., 1 ♀, 20-VII-1973.

20. *Tabanus regularis* JAENNICKE, 1866.

Tabanus regularis JAENNICKE, 1866. *Berl. ent. Z.*, 10: 85.

Segovia: Riaza, 1.200 m., 1 ♀, 11-VII-1973.

Algarve: Baragem de Arade, 400 m., 2 ♀ ♀, 22-VII-1973; Silves, 120 m., 2 ♀ ♀, 20-VII-1973.

BIBLIOGRAFÍA

- LECLERCQ, M., 1964.—*Tabanidae (Diptera)* du Portugal, I. Diagnose de *Tabanus darimonti* n. sp.—*Mem. Estudos Museu Zool. Univ. Coimbra*, n.º 288, 15 págs.
- LECLERCQ, M., 1971.—Les problèmes posés par *Pangonius micans* MEIGEN (*Diptera, Tabanidae*) suceur de sang en Espagne.—*Bull. Rech. agron. Gembloux*, N. S., 6: 416-423.
- LECLERCQ, M., 1974.—*Pangonius hermanni* KRÖBER et *Tabanus briani* LECLERCQ (*Diptera, Tabanidae*). Diagnose des mâles.—*Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg.*, 110: 173-177.
- LECLERCQ, M., 1977.—Tabánidos españoles de las provincias de Oviedo y Santander (*Diptera*).—*Graellsia*, Madrid, 32: 219-226.
- LECLERCQ, M. y OLSUFJEV, N. G., 1975.—Catalogue des *Tabanidae (Diptera)* paléarctiques.—*Bull. Ann. Soc. r. belge Ent.*, 111: 23-36 y 298.