

Dispersion de *Cordylobia anthropophaga* (BLANCHARD)
(Diptera Calliphoridae)

par M. LECLERCO

Cordylobia anthropophaga (BLANCHARD), responsable de myiase cutanée furonculaire chez l'homme et chez les animaux, était jusqu'à présent une mouche distribuée largement en Afrique, au sud du Sahara.

Des cas de myiase cutanée contractée en Afrique ont déjà été observés dans plusieurs pays européens dont la Belgique (LECLERCO, 1980).

Ses exigences écologiques ne lui permettent pas de s'établir n'importe où. Récemment, BÜTTIKER, HABAYEB, ZUMPT (1980) ont signalé cinq cas de myiase cutanée chez l'homme, à Asir, Sud-Ouest de l'Arabie Saoudite. Ultérieurement, on devra contrôler si elle parvient à s'installer dans ces contrées à climat favorable.

BIBLIOGRAPHIE

- BÜTTIKER W., HABAYEB S., ZUMPT F., 1980. — Medical and Applied Zoology in Saudi Arabia : First records of the tumbu fly (*Cordylobia anthropophaga* (BLANCHARD), Dipt. Fam. Calliphoridae). In WITTMER W., BÜTTIKER W. (Editors). Fauna of Saudi Arabia, vol. 2, Basle, Switzerland, Ciba-Geigy Ltd : 440-443.
- LECLERCQ M., 1980. — Nouveau cas de myiase cutanée furunculuse par *Cordylobia anthropophaga* (BLANCHARD) (Dipt. Calliphoridae) en Belgique. Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116 : 208-209.

Cephalia (*Myrmecomys* nec *Myrmecomysia*) *rufipes* MEIGEN
(Diptera Otitidae)

par M. LECLERCQ

Espèce dont les larves sont saprophages et les adultes anthophiles, herbicoles. Antérieurement, on la classait dans les Platystomatidae (Platystomidae).

Répartition géographique : Amérique du Nord (Arizona, Mexique du Nord) d'après STONE *et al.* (*Agric. Handb. n° 276, Agric. Res. Serv., Washington*, 1965) et en Europe (Espagne, Italie, Autriche, Allemagne - var. *nigripes* MEIGEN). En France, SÉGUY, en 1934 (*in* Faune de France, vol. 28, Paris, Lechevalier), la signale des Landes, de l'Allier, de la Nièvre, des Hautes Pyrénées, de Saône et Loire. De mon côté, je puis ajouter : Vaucluse, L'Isle-sur-la-Sorgue 23.VII.1980, 1 ♀ ; Alpes de Haute Provence, Peyresq 18/25.VII.1968, 1 ♀. Ces derniers exemplaires sont conservés dans les collections de la Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux.

Neavella albipectus verstraeteni n. ssp. de Madagascar
(Diptera Tabanidae)

par M. LECLERCQ

Le genre *Neavella* OLDROYD (1954) est représenté par trois espèces (*notopleuralis* OLDROYD (1954), *producticornis* (AUSTEN, 1912), *albipectus* (BIGOT, 1859) ; elles existent sur la côte Est de l'Afrique y compris les îles de Sokotra à Madagascar. Leur identification est aisée avec la monographie d'OLDROYD (1954).

Un exemplaire inédit a été trouvé dans les collections de la Faculté des Sciences agronomiques de l'Etat, Zoologie générale et Faunistique (Pr. J. LECLERCQ, Gembloux). Il correspond partiellement à la description de *Neavella albipectus* (BIGOT, 1859) mais s'en différencie très nettement. Il nous paraît justifié de le considérer comme une sous-espèce. Nous la dédions à M. C. VERSTRAETEN, conservateur de ces collections où le type est déposé. Il provient de Madagascar, littoral Sud-Ouest, Margrave, Sud Culéar, ♀, 13.IV.1965.

- I. Callosité frontale basale rectangulaire, prolongée par une extension supérieure médiane large et courte. Palpes blanc jaunâtre avec poils noirs et blancs entremêlés . . . *albipectus albipectus* (BIGOT, 1859).