OPÉRATION MONOCULAIRE DU FORT STRABISME DIVERGENT

par Roger Weekers (Liége)

L'opération consiste essentiellement à attacher provisoirement le muscle droit interne au muscle droit externe situé vis-à-vis. Maintenu dans cette situation pendant sept jours, le muscle droit interne contracte de nouvelles adhérences avec le globe ; il est fortement raccourci ; son action est considérablement renforcée.

Cette intervention est indiquée dans toutes les formes de strabisme divergent quelle qu'en soit la nature, plus particulièrement dans les cas de forte déviation. Les résultats sont constants et sûrs, comme en témoigne la documentation photographique que nous vous présentons.

Cette opération innovée par L. Weekers (2, 3, 4, 5, 6) est en usage à la Clinique universitaire de Liége, depuis vingt-cinq ans. J. Colmant (1) assistant de la Clinique a été chargé de la décrire à la réunion de notre Société en 1925. On trouvera tous les détails techniques dans un travail actuellement à l'impression (L. Weekers et R. Weekers) (7).

BIBLIOGRAPHIE

- (1) COLMANT (J.). Bull. Soc. franç. Ophtalm., 1925, 38, 719.
- (2) WEEKERS (L.). Ophthalmologica, 1938-39, 96, 210.
- (3) WEEKERS (L.). Bull. Soc. belge Opht., 1939, 78, 43.
- (4) WEEKERS (L.). Rev. Méd. de Liége, 1947, 2, 329.
- (5) WEEKERS (L.). Bull. Soc. belge Opht., 1947, 86, 18.
- (6) WEEKERS (L.). Amer. Journ. Ophth., 1948 (sous presse).
- (7) WEEKERS (L. et R.). Ann. Oculist., 1948 (sous presse).

Dr A. STEIN (Saint-Gall, Suisse). — Dans l'opération qu'il vient de décrire, le Dr Weekers emploie le pansement binoculaire. Je voudrais faire une petite remarque à propos du pansement dans l'opération du strabisme en général. En effet, depuis un an environ le Dr Bangerter applique à la Clinique ophtalmologique de Saint-Gall un pansement monoculaire pendant six jours au maximum dans tous les cas de strabisme aussi bien convergent que dïvergent et indépendamment de l'âge du malade. Nous avons ainsi opéré 106 cas avec pansement monoculaire et enregistré les mêmes bons résultats qu'avec le pansement binocluaire.

Il est inutile de souligner le soulagement apporté au malade par l'application du pansement monoculaire, alors qu'autrement les malades sont condamnés à l'immobilisation les deux yeux bandés pendant une semaine ou même davantage, selon les différents auteurs.

Le Gérant: GEORGES MASSON.