

REPARTITION DE TABANUS SPODOPTEROIDES

O.M.C.

(DIPTERA TABANIDAE)

par M. LECLERCQ

Nous avons déjà signalé la présence en France de Tabanus spodo-
pteroides O.M.C., voisin de T. paradoxus JAEN. et de T. spodopterus
MEIG. (LECLERCQ, 1981). Voici un complément d'information, T. spo-
dopteroides O.M.C. est une espèce méditerranéenne occidentale :
Italie: Imperia (OLSUFJEV, MOUCHA, CHVALA, 1969); CHVALA, LYNEBORG,
MOUCHA, 1972; LECLERCQ, 1973; SCHACHT, 1980). France: Gard (LECLER-
CQ, 1981), Peyregrosse, ♀, 21.VII.1981; Hérault: Source de la Buèg-
es, ♀, 7.VII.1984, St Jean de Buèges, ♀, 9.VII.1984 (M. LECLERCQ).
Espagne: Barcelona, Tarragona, Cuenca, Murcia, Salamanca, Caceres,
Avila (LECLERCQ, 1972; PORTILLO, 1982). Maroc: forêt de Bab Azhar,
♀, 11.VII.1961; Ketama, ♀, 10.VII.1968 (M. LECLERCQ).

BIBLIOGRAPHIE

- CHVALA, M., LYNEBORG, L., MOUCHA, J., 1972.- The Horse Flies of Europe (Diptera Tabanidae). Ent. Soc. Copenhagen. 495 p.
- LECLERCQ, M., 1972.- Tabanidae (Diptera) d'Espagne (récoltes dans les Montes Universales). Pirineos, 103: 27-32.
- LECLERCQ, M., 1973.- Tabanidae (Diptera) des Alpes-Maritimes. Ibid. 109: 63-72.
- LECLERCQ, M., 1981.- Présence en France de Tabanus spodopteroides O.M.C. (Diptera Tabanidae). Bull. Annls Soc. r. belge Ent., 117: 82.
- OLSUFJEV, N.G., MOUCHA, J., CHVALA, M., 1969.- Tabanus spodopteroi-
des sp. n., eine neue Bremsen-Art aus der Tabanus bovinus Gruppe. Angew. Parasitol., 10: 37-39.
- PORTILLO, M., 1982.- Revision de los Tabanidos de Espana (Diptera Tabanidae). Universidad de Salamanca, Fac. Biologia, Dep. Zoologia.
- SCHACHT, W., 1980.- Faunistische Beiträge zu einigen seltenen euro-
päischen Bremsen-Arten (Tabanidae, Diptera). Entomofauna, 1, 19: 384-396.