


Analyse de l'ensemble des dossiers ouverts selon le genre

Nombre de dossiers par âge en fonction du genre




	Femme	Homme
Moyenne	25	23
Médiane	22	22
Minimum	0*	2
Maximum	83	59

* Minimum de 2 mois

Pourcentage de dossier en fonction du genre




Pyramide des âges selon le genre




Analyse des dossiers ouverts impliquant des substances

Dossiers dans lesquels la victime rapporte avoir consommé de l'alcool selon l'âge

→ Diminution significative de la consommation auto-rapportée d'alcool en fonction de l'âge
 $\beta = -0,024$; $\sigma = 0,006$;
 $z\text{-value} = -3,97$; $OR = 0,98$;
 $p < 0,001$



Dossiers dans lesquels la victime rapporte avoir consommé de la drogue selon l'âge



→ Diminution significative de la consommation auto-rapportée de drogue en fonction de l'âge
 $\beta = -0,0189$; $\sigma = 0,00837$; $z\text{-value} = -2,26$; $OR = 0,98$; $p < 0,001$

Introduction


Une agression sexuelle est définie comme un acte sexuel non consenti. Parmi ces agressions sexuelles, il existe une catégorie spécifique appelée agressions sexuelles facilitées par une substance (ASFS). Ce terme désigne un type d'agressions sexuelles dans lesquelles une substance psychoactive est impliquée. Elles peuvent être classées en deux sous-catégories : les ASFS proactives, où la substance est administrée à l'insu de la victime, et les ASFS opportunistes, où la victime consomme elle-même volontairement la substance (1).

L'étude avait pour objectif d'estimer la prévalence des ASFS dans les dossiers ouverts dans les Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS), en tenant compte du genre et de l'âge des victimes.

Méthodologie

Cette étude est une analyse rétrospective des données issues des Centres de Prise en Charge des Violences Sexuelles (CPVS) de Bruxelles, Gand et Liège récoltées entre octobre 2017 et octobre 2018.

Dossiers dans lesquels la victime pense avoir été droguée selon l'âge



→ Diminution non significative de l'administration de drogue en fonction de l'âge
 $\beta = -0,0155$; $\sigma = 0,0109$;
 $OR = 0,98$; $z\text{-value} = -1,42$;
 $p = 0,15$

Conclusion

La majorité des dossiers ouverts dans un centre de prise en charge des violences sexuelles concernent les femmes, avec une répartition selon l'âge qui varie en fonction du genre. Les victimes de moins de 10 ans sont proportionnellement plus nombreuses dans le genre masculin que dans le genre féminin. Entre 10 et 35 ans, la proportion semble être équilibrée, puis elle s'inverse après 35 ans, les cas concernent davantage le genre féminin à partir de cette tranche d'âge-là.

Par ailleurs, l'implication de substances dans les agressions évolue en fonction de l'âge. En effet, les victimes de moins de 10 ans ont subi uniquement des agressions sexuelles sans utilisation de substances. Pour les autres tranches d'âge, parmi les agressions sexuelles facilitées par une substance, il ressort des données que les ASFS opportunistes sont plus fréquentes que les ASFS proactives, une tendance également observée dans des études antérieures (2, 3). En outre, l'alcool est la substance la plus fréquemment impliquée dans les ASFS, ce qui est en accord avec la littérature (1, 3).

En se basant sur ces différents résultats, il est possible d'identifier un cas « typique » d'ASFS, qui se présente comme une agression sexuelle facilitée par une substance impliquant une femme de 22 ans ayant consommée de l'alcool et dont les effets vont servir l'agresseur.

Références

- Anderson, L.J., Flynn, A., & Pilgrim, J. L. (2017). A global epidemiological perspective on the toxicology of drug-facilitated sexual assault: A systematic review. *Journal of forensic and legal medicine*, 47, 46-54
- Hall, J. A., & Moore, C. B. T. (2008). Drug facilitated sexual assault—a review. *Journal of forensic and legal medicine*, 15(5), 291-297.
- García, M. G., Pérez-Cárceles, M. D., Osuna, E., & Legaz, I. (2021). Drug-facilitated sexual assault and other crimes: A systematic review by countries. *Journal of forensic and legal medicine*, 79, 102151.

Contact

Université de Liège (Belgique)
 Psychologie & Neurosciences de la Cognition (PsyNCog)
 Centre de Prise en Charge des Violences Sexuelles (CPVS)
 Corresponding author :
 Leeloo Godefroid (lgodefroid@uliege.be)

