

moustérien et des éclats avec retouches d'utilisation; toutes ces pièces sont en silex ou en phtanite.

Nous avons constaté l'absence complète de burins ou autres instruments de type aurignacien.

Nous nous trouvons en présence d'un niveau moustérien qui semblerait plus ancien que le niveau inférieur ou 3^e niveau de la terrasse fouillé par Marcel De Puydt et Max Lohest. Notre moustérien de Spy offre les plus grandes analogies avec le moustérien de Sainte-Walburge (Liège) considéré par Victor Commont, par Marcel De Puydt et par nous, comme étant du Vieux Moustérien.

Les Professeurs Fraipont et Suzanne Leclercq ont étudié la faune recueillie au cours de nos recherches.

Nous terminons en réitérant nos vifs remerciements à MM. Fernand et Paul Henricot, qui ont bien voulu mettre à notre disposition deux de leurs ouvriers pour aider les nôtres.

LA FAUNE DES NIVEAUX INFÉRIEURS DE SPY,

par Charles FRAIPONT et Suzanne LECLERCQ.

La faune était assez abondante aux trois points où nous avons atteint le niveau le plus inférieur de la caverne de Spy.

Comme le faisait prévoir l'industrie, nous nous trouvons à un niveau plus ancien que celui des célèbres squelettes, niveau qui, pour nous, représente dans nos pays le moustérien chaud de Weimar-Grimaldi, le plus ancien moustérien de nos cavernes qui correspond au « Riss-Wurm » et qui, d'après BREUIL, est même plus ancien que son Levalloisien V.

Le réchauffement du dernier interglaciaire a été dans nos pays beaucoup moins accentué qu'au sud de l'Europe.

Le Renne manque presque complètement, nous en avons un très petit fragment de maxillaire au niveau du beau coup de poing en phtanite et une molaire au niveau des petits coups de poing. L'*Equus caballus* de grande taille est très abondant ainsi que *Hyaena spelaea*, *Rhynoceros tichorhinus*; *Bos primigenius* est assez abondant. Le petit cheval est rare ainsi que le bison et *Felis spelaea*, *Cervus megaceros*, *Gulo luscus*, *Canis lupus*, *Canis lagopus*; moins rares sont *Elephas primigenius*, et *Ursus spelaeus*.

Les déblais de fouilles antérieures nous ont fourni quelques fragments du pied de *Homo neanderthalensis* dont un premier métatarsien droit qui montre l'écartement du gros orteil chez cette espèce. Au point de vue de la faune, nous devons ajouter à ce qu'ont dit les premiers fouilleurs, le *Cormoran* et *Gallus sonnerati* forme encore inconnue dans nos cavernes.